

UPADACITINIB

(RINVOQ® comprimidos)



Servicio de Farmacia
HGU Gregorio Marañón

QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Es un inhibidor de las enzimas JAK, que actúa modulando la respuesta inmune e inflamatoria en enfermedades crónicas como la **artritis reumatoide**.

CÓMO ADMINISTRARLO

Upadacitinib se administra por vía oral. La pauta habitual es de un comprimido de 15 mg tomado 1 vez al día. Puede tomar los comprimidos con o sin alimentos, en cualquier momento del día. Los comprimidos se deben tragar enteros, y no se deben partir, triturar o masticar.

QUÉ HACER SI SE LE OLVIDA UNA TOMA

Si se olvida una dosis, tómela tan pronto como sea posible y continúe con su calendario habitual. Si la dosis olvidada está más próxima a la siguiente toma, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER

- Es frecuente la aparición de infecciones respiratorias de las vías altas (sinusitis aguda, laringitis, nasofaringitis, dolor orofaríngeo, faringitis, faringoamigdalitis, rinitis, sinusitis, amigdalitis, infecciones víricas).
- Podría aparecer de neutropenia, hipercolesterolemia, tos, náuseas o aumento de: CK sanguínea, ALT, AST y peso.
- Upadacitinib afecta al sistema inmunitario pudiendo afectar a las defensas del paciente frente a infecciones o a la respuesta adecuada a determinadas vacunas. Antes del inicio de tratamiento deben ser descartadas infecciones latentes como tuberculosis o hepatitis víricas.
- Debe acudir a su médico o a Urgencias si presenta síntomas de infección (fiebre, tos persistente, debilidad, pérdida de peso...) durante el tratamiento.
- Debe avisar a su médico o farmacéutico antes de ponerse una vacuna.
- No se debe utilizar Upadacitinib durante el embarazo. Se debe utilizar anticoncepción efectiva y evitar la lactancia materna durante el tratamiento y hasta al menos 4 semanas después de la última dosis.

COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO SI:

- Ha estado en contacto con un enfermo de tuberculosis.
- Tiene problemas del corazón, tensión arterial elevada, colesterol alto, coágulos en piernas o pulmones.
- Está tomando otros medicamentos, con o sin receta, suplementos dietéticos o productos naturales.
- Tiene programada alguna operación quirúrgica (incluye cirugía dental).

Y RECUERDE...

- No utilice el medicamento una vez superada la fecha de caducidad. Devuelva la medicación no utilizada a la Farmacia.
- Upadacitinib se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarles aunque tengan síntomas similares a los suyos.
- Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.
- Para recoger su medicación es necesario presentar la Tarjeta Sanitaria y la receta en vigor (revise que la fecha de validez sea posterior al día en curso, en caso contrario deberá acudir a su médico para que le renueve la receta).
- Nuestro horario de dispensación es de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el Servicio de Farmacia del CEIMI (C/ Francisco Silvela, 40, 6ª planta). Debe acudir a recoger su medicación el día y la hora de su cita programada. Si no pudiera acudir el día de su cita, le rogamos que llame lo antes posible al teléfono 914269366 para cambiarla. En horario de tarde puede recoger su medicación en el Servicio de Farmacia del Hospital Gregorio Marañón, de lunes a viernes de 14:30h a 18:30h.
- Para cualquier consulta sobre su tratamiento puede llamarnos de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el teléfono 914269271 o escribir a la dirección de correo electrónico: farmacia.ceimi.hgugm@salud.madrid.org

NO SE QUEDE CON DUDAS. PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.

PARA MÁS INFORMACIÓN: **915868414**
www.madrid.org/hospitalgregoriomarañon/farmacia



@farma_gregorio