

SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA

UNIDADES DE SUPERESPECIALIZACIÓN

UNIDAD DE PÁRPADOS Y VÍA LAGRIMAL

Orzuelo

El Orzuelo es una inflamación infecciosa aguda que afecta a las glándulas sebáceas que se encuentran los párpados (Glándulas de Zeiss o Glándulas de Meibomio). Aparece un bulto rojo y doloroso que puede producir inflamación de todo el párpado e incluso dificultar la apertura del mismo.

Tratamiento

El orzuelo se puede tratar con antibióticos y antiinflamatorios tópicos, principalmente en pomada, combinado con masajes con compresas o gasas calientes sobre los párpados con los ojos cerrados durante unos 5-10 minutos, entre 2-3 veces al día.

En la mayoría de las ocasiones con este tratamiento el orzuelo y la inflamación roja y dolorosa desaparece.

Chalacion

El chalacion es una inflamación crónica de una de las pequeñas glándulas que se encuentran en los párpados, llamadas Glándulas de Meibomio. Se confunde en ocasiones con el orzuelo, pero a diferencia de éste no suele doler, ni aparecer enrojecimiento palpebral. Encontramos un nódulo indurado en el borde del párpado pero indoloro.



El chalacion y el orzuelo pueden aparecer con mayor frecuencia en pacientes que presentan blefaritis, o inflamación crónica del borde libre de los párpados, con enrojecimiento, sensación de arenilla y secreción seca y costrosa (como caspa).

También aparece con mayor frecuencia relacionado con trastornos crónicos, como Rosácea o Dermatitis Seborreica.

Tratamiento

El chalacion se trata con tratamiento tópico de antibióticos y antiinflamatorios. Este tratamiento puede repetirse, siempre a juicio del Oftalmólogo.

En ocasiones puede persistir la inflamación crónica y precisar de infiltración de un antiinflamatorio de acción prolongada en el chalacion para favorecer su resolución.

En algunos casos puede ser necesaria la escisión quirúrgica en quirófano con anestesia local en el párpado.