



Para asegurar el buen resultado de la intervención debe seguir cuidadosamente las siguientes recomendaciones. Su cumplimiento es especialmente importante durante las primeras 48 horas. A partir del 2º día podrá ir retomando su actividad normal e irse readaptando progresivamente a su entorno familiar, social y laboral.

1. Evite agachar la cabeza o hacer movimientos bruscos.
2. No haga esfuerzos físicos ni cargue pesos.
3. Evite la tos y el estreñimiento.
4. No se toque ni frote el ojo. No apriete los párpados.
5. No duerma sobre el lado del ojo operado.
6. Cuando salga a la calle utilice unas gafas de sol.
7. Si se lava la cabeza, hágalo flexionándola hacia atrás, no hacia adelante.
8. No utilice cosméticos ni tintes para el pelo durante 3 semanas.

TRATAMIENTO POST- OPERATORIO:

El tratamiento postoperatorio debe comenzar el mismo día de la intervención quirúrgica.

- **EXOCÍN COLIRIO® :**
 - 1 GOTA CADA 4 HORAS durante la primera semana.
- **MAXIDEX COLIRIO® :**
 - 1 GOTA CADA 4 HORAS durante la primera semana.
 - 1 GOTA CADA 8 HORAS durante la segunda semana.
 - 1 GOTA CADA 12 HORAS durante la tercera semana.
 - 1 GOTA CADA 24 HORAS durante la cuarta semana.
- Este tratamiento podrá ser modificado a criterio de su Oftalmólogo según su caso particular.....
.....

Para administrar las gotas, siga los siguientes consejos:

1. Lávese previamente las manos.
2. Tire suavemente del párpado inferior (nunca del superior) y mire hacia arriba.
3. Al poner la gota procure que el extremo del colirio no roce el ojo.
4. A continuación, mantenga el ojo cerrado suavemente durante unos segundos.
5. Si se tiene que poner varias gotas, deje un intervalo entre ellas de 4-5 minutos

Con relativa frecuencia en los primeros días pueden aparecer ciertos síntomas oculares como visión de manchas flotantes, fotofobia, lagrimeo, picor, sensación de cuerpo extraño o incluso dolor. Se trata de síntomas propios de la inflamación y cicatrización, normalmente pasajeros y que ceden con el tratamiento que se le ha prescrito.

En caso de dolor puede tomar analgésicos de tipo paracetamol, pero no aspirina. Si por el contrario notara un dolor ocular intenso que no cede a los analgésicos habituales, pérdida brusca de visión o enrojecimiento acentuado de su ojo, póngase en contacto con Urgencias (24 horas) o el Servicio de Oftalmología (Horario de Consulta).

❖ **Acudirá a la primera revisión en la fecha que le indique su cirujano en el Informe de Alta (Consultas de Oftalmología: 2ª Planta, BLOQUE M.)**

❖ **Teléfonos de Contacto a través de Centralita: 911912000 contactar con**
- **Urgencias :911912200**
- **Consulta de Oftalmología: 911912660**

