

UNIDAD DE UROLOGÍA. CONSULTAS EXTERNAS

PREPARACIÓN DEL PACIENTE PARA INSTILACIÓN ENDOVESICAL CON MITOXANTRONA

ANTES DE LA INSTILACIÓN:

- ✓ Disminuir al máximo el consumo de líquidos 4 horas antes de la instilación.
- ✓ No es necesario que acuda en ayunas.
- ✓ La noche anterior y dos horas antes, tomará 1 cucharadita de bicarbonato.
- ✓ Tomará un antibiótico, según prescripción médica.
- ✓ Acudirá el día de la cita a la segunda planta en **Bloque I (Urología)**

DESPUÉS DE LA INSTILACIÓN:

- ✓ No orinar durante las dos horas siguientes a la instilación.
- ✓ No beber durante esas dos horas.
- ✓ Es aconsejable, durante esas dos horas, que cambie de posición varias veces, con el fin de que el medicamento llegue a todas las zonas de la vejiga.
- ✓ Mantener reposo relativo las dos horas siguientes.
- ✓ Orinar sentado durante las 6 horas siguientes.
- ✓ El tratamiento puede inducir a una coloración verde azulada de la orina que carece de importancia durante las 24 horas después de la administración.
- ✓ Lavarse los genitales y las manos después de cada micción.
- ✓ Beber abundantes líquidos, pasadas las 2 horas desde la administración del producto.
- ✓ Tomará un antibiótico hasta el día siguiente de la instilación, según prescripción médica.

Si en los días previos a la realización de la prueba no pudiera acudir a la cita por cualquier motivo rogamos que lo notifique al Servicio de Admisión del Hospital (Teléfono: 91.191.20.00)