
	INSTRUCCIÓN PARA EL PACIENTE	IP 031
ANTÍGENO HELICOBACTER EN HECES		

1. Breve Información sobre la prueba

- a. **Denominación:** Antígeno de Helicobacter pylori en heces.
- b. **Finalidad:** Test inmunocromatográfico rápido y no invasivo, basado en la utilización de anticuerpos monoclonales para la detección cualitativa de antígenos de Helicobacter pylori en heces humanas. Su objetivo es aportar información:
 - de interés diagnóstico en relación con la posible presencia y asociación del H. Pylori como agente causal de trastornos y enfermedades gastrointestinales (gastritis, úlceras duodenales o gástricas, etc.).
 - sobre la eficacia del tratamiento realizado para erradicar el H. pylori.
- c. **Rendimiento:** eficacia diagnóstica superior al 92%.
- d. **Procedimiento:** Consiste en la recogida de una muestra de heces, en el contenedor que se le facilitará en la consulta del Hospital o del Centro de Salud.

2. Material necesario que le entregarán en la Consulta / Centro de Salud o será adquirido en la Farmacia

Contenedor estándar para la recogida de heces

Le será entregado en la consulta del Hospital o de su centro de Salud o bien será adquirido en la Farmacia



3. Preparación previa del paciente

Para obtener los mejores resultados, y evitar posibles falsos negativos en la prueba, se recomienda que el paciente debería haber suspendido el tratamiento con:

- antibióticos durante al menos un periodo de 4 semanas
- fármacos inhibidores de la bomba de protones (omeprazol, etc) al menos durante dos semanas.

4. Procedimiento de recogida

Contenedor estándar de heces

- a. Recoja las heces sobre un recipiente de boca ancha tipo orinal o cuña. No es necesario que esté estéril, sólo es preciso que esté limpio y bien aclarado. No contendrá restos de jabones, detergentes o desinfectantes.
- b. Tomar el contenedor estándar de heces que le ha sido facilitado o adquirido en la farmacia
 - Identificarlo con su nombre y apellidos
 - Desenroscar y quitar el tapón
 - Introducir una porción de las heces en el mismo
 - Cerrar el contenedor, y si no se entrega de forma inmediata mantenerlo refrigerado hasta su entrega en el centro sanitario.
 - Entregarlo en el Centro o Consulta, para su envío al Laboratorio.

No dude consultar en el Centro cualquier información adicional que necesite