

| | | |
|----------------------------|--|------------------------------|
| Area de Laboratorio | INSTRUCCIÓN PARA EL PACIENTE | IP - LGE - 022 |
| | PRUEBA DINÁMICA DE XILOSA EN PACIENTES NO DIABÉTICOS INSULINODEPENDIENTES | Versión 1.2 Página 1 de 1 |

1. Breve Información:

La prueba de la D-Xilosa se utiliza como test de cribado para el estudio de mala absorción de Carbohidratos.

Para realizarla es preciso ingerir por vía oral una cantidad de Xilosa y luego cuantificar su eliminación por la orina (de cinco horas) y su nivel en sangre a las dos horas.

La duración total de la prueba es de cinco horas

Si es usted *Diabético insulino dependiente debe comunicárselo al Médico peticionario* ya que en éste caso este protocolo no es válido y debe efectuar el protocolo del Test de Xilosa para pacientes insulino dependiente.

2. Material necesario que se le entregará en el Centro:

Contenedor de plástico opaco de 3 L. (Cód. 3004773) que se le entregará durante la ejecución de la prueba.

3. Preparación previa del paciente:

- Adultos: Realizar un ayuno mínimo de 8 horas
- Niños: Realizar un ayuno de 4 horas.

4. El día de la Prueba:

Acuda entre las 07:30 y las 08:00 horas del día de su cita.

5. Durante la realización de la prueba:

- Durante todo este período de tiempo debe permanecer en reposo y no puede ingerir ningún alimento
- Inicialmente le realizarán una extracción de sangre basal.
- Justo antes de la ingesta de la Xilosa deberá realizar una primera micción (orina) en el servicio, despreciándola. NO RECOGERÁ aún esa orina en el contenedor.
- Seguidamente deberá ingerir 25 gr. de Xilosa disueltos en agua
- Posteriormente deberá recoger en el contenedor toda la orina que emita durante las cinco horas siguientes a la administración de Xilosa.
- 1 hora después de la ingesta de Xilosa deberá beber 1 ó 2 vasos de agua.
- 2 horas después de la ingesta de Xilosa le realizarán una nueva extracción de sangre.