

PREPARACIÓN PARA ENEMA OPACO CON CITRAFLEET®

| | |
|-----------------------|--|
| 72 HORAS ANTES | DIETA POBRE EN RESIDUOS Arroz, pastas, caldos, carne y pescado a la plancha, quesos duros, biscotes o galletas sin fibra, zumos filtrados, infusiones, té, café y bebidas sin burbujas |
|-----------------------|--|

NO PUEDE TOMAR Ensaladas, verduras, legumbres, fruta, patatas, carnes y pescados en salsa, embutidos, leche, yogur, queso fresco/blando, grasas, pasteles y bebidas con gas

| | |
|-----------------------|---|
| 24 HORAS ANTES | SOLO DIETA LIQUIDA COLADA Aguas, caldos filtrados, zumos colados, infusiones, té, café (sin leche) y bebidas sin burbujas |
|-----------------------|---|

INSTRUCCIONES DE TOMA DE CITRAFLEET

CITA POR LA MAÑANA

| | |
|-----------------|---|
| 1ª Dosis | A las 18:00 horas del día anterior a la exploración, diluir el primer sobre de CITRAFLEET en un vaso de agua y beber la solución, a continuación debe beber como mínimo 2 litros de agua o líquidos debidamente filtrados para evitar residuos, sin gas, ni alcohol. |
| 2ª Dosis | A las 22:00 horas del día anterior a la exploración, diluir el segundo sobre de CITRAFLEET en un vaso de agua y beber la solución, a continuación debe beber como mínimo 2 litros de agua o líquidos debidamente filtrados para evitar residuos, sin gas, ni alcohol. |

CITA POR LA TARDE

| | |
|-----------------|---|
| 1ª Dosis | A las 07:30 horas del mismo día de la exploración, diluir el primer sobre de CITRAFLEET en un vaso de agua y beber la solución, a continuación debe beber como mínimo 2 litros de agua o líquidos debidamente filtrados para evitar residuos, sin gas, ni alcohol. |
| 2ª Dosis | A las 10:30 horas del mismo día de la exploración, diluir el segundo sobre de CITRAFLEET en un vaso de agua y beber la solución, a continuación debe beber como mínimo 2 litros de agua o líquidos debidamente filtrados para evitar residuos, sin gas, ni alcohol. |

IMPORTANTE:

- Debe guardar ayuno absoluto, 3 horas antes de la prueba no tomará NADA, ni siquiera agua.
- Deberá suspender la toma de medicamentos con hierro cinco días antes.