

HOSPITAL DE DIA DE ALERGOLOGÍA

Información general

Los días que esté citado para el estudio de alergia a medicamentos o alimentos deberá acudir al Hospital de Día de Alergia (Consultas Externas, 1ª planta pasillo 1).

Si los días previos a esta prueba comenzara con síntomas catarrales/ fiebre o tratamiento con antibióticos y/o lesiones cutáneas extensas (brotes intensos de dermatitis atópica, urticaria...) deberá consultar la página web del hospital en el apartado de “gestiona tu cita” para retrasarla.

No debe venir en ayunas.

Para la realización de las pruebas debe estar al menos una semana antes de la cita sin tomar antihistamínicos ni corticoides orales.

Si tiene dudas respecto a la preparación que debe seguir para realizar las pruebas a las que está citado puede contactar con nosotros en los teléfonos 91 191 53 67- 91 191 41 10 en horario de mañana de lunes a viernes de 11:30 a 14:00h y en horario de tarde de lunes a miércoles de 16:30 a 19:00h

Información específica

Parches

Si se le van a poner pruebas epicutáneas (parches) con medicamentos o alimentos, no puede estar tomando antihistamínicos desde 5 días antes y corticoides al menos las dos semanas previas.

Estudio de medicamentos:

1. Deberá acudir desayunado o comido en función del horario de la prueba (mañana o tarde)
2. Podrá acudir con su medicación habitual tomada, salvo en el caso que tome tratamiento antihipertensivo con Betabloqueantes o IECAS, que deberá suspender 24 horas antes de la prueba. Deberá acudir a su Médico de Atención Primaria previamente para valorar sustituir estos tratamientos durante la duración de estas pruebas
3. La duración de la prueba de tolerancia oral es de entre 4-6 horas

Provocaciones con alimentos:

1. Niños menores de 5 años vendrán en ayunas. Resto de pacientes vendrán desayunados o comidos en función del horario de la prueba (mañana o tarde)
2. Si el paciente es un niño deberá traer una muda de ropa (camiseta, body, pañal...) y comida, puesto que la prueba dura entre 4-6h.
3. En el caso que tome tratamiento antihipertensivo con Betabloqueantes o IECAS, deberá suspenderlo 24 horas antes de la prueba. Deberá acudir a su Médico de Atención Primaria previamente para valorar sustituir estos tratamientos durante la duración de estas pruebas.

Gracias por su colaboración