



RECUERDE SIEMPRE TRAER ESTE IMPRESO A:

- CONSULTAS: PLANTA CERO
- DÍA DE LA INYECCIÓN/ES: CMA 5ª PLANTA

MEDICACIÓN	OJO	FECHA	HORA	PUNTO DE ENTRADA

SECRETARÍA DE OFTALMOLOGÍA Teléfono: 91-5202269
(en caso de dudas sobre los días u horas de las inyecciones)

MEDICO PRESCRIPTOR:

LEA REVERSO

DEBE COMUNICAR AL PERSONAL AUXILIAR ANTES DE ENTRAR EN CMA PARA LA INYECCIÓN:

- Si en los días previos tiene o ha tenido el ojo rojo, secreciones, dolor ocular o pérdida brusca de visión.
- Si es alérgico a algún tipo de anestésico, a povidona iodada (Betadine) o clorhexidina.
- Evite venir el día de las inyecciones con maquillaje facial y ocular.

PRECAUCIONES DESPUÉS DEL TRATAMIENTO:

Es habitual tener algo de molestia tras la inyección, y en algunas ocasiones aparece un derrame sanguinolento que puede manchar la gasa, se resolverá espontáneamente en unos días.

Es posible que perciba manchas negras móviles que suelen resolverse en un par de días.

Puede llevar a cabo su vida habitual sin grandes limitaciones.

No deberá frotarse los ojos, ni sumergirse en piscinas o equivalentes, ni que entren líquidos en su ojo durante 3 días salvo medicación ocular prescrita por un profesional.

SÍNTOMAS DE ALARMA QUE REQUIEREN VALORACIÓN OFTALMOLÓGICA URGENTE:

- Disminución de la visión.
- Importante dolor ocular con la luz.
- Enrojecimiento del ojo diferente al causado por la inyección
- Secreción purulenta del ojo intervenido.
- Especialmente la pérdida muy importante de visión, con dolor ocular y enrojecimiento pueden ser síntomas infección ocular grave.