

<b>SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN</b>	<b>INFORMACIÓN AL PACIENTE</b> <b>EMBOLIZACIÓN de un VARICOCELE</b>
---	--

<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un varicocele es una dilatación de venas que rodean al testículo. La embolización sirve para taponar las venas afectadas.</li> <li>• Se pincha una vena del brazo utilizando anestesia local.</li> <li>• Se introduce un catéter (tubo muy fino), por el que se inyecta contraste para ver los vasos sanguíneos en las radiografías.</li> <li>• Se ponen unos dispositivos metálicos muy pequeños que interrumpen la circulación de la sangre.</li> <li>• En ocasiones, sobre todo por la existencia de variantes anatómicas, no es posible realizar la embolización.</li> </ul>
<b>CONSENTIMIENTO INFORMADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es imprescindible la firma del consentimiento por los responsables del paciente, y por los pacientes mayores de 16 años.</li> <li>• Se lo debe entregar el médico que solicita este procedimiento, también se puede descargar en la web del hospital.</li> <li>• El radiólogo que hará la técnica le explicará todos los detalles y responderá a sus dudas el día de su realización.</li> </ul>
<b>PREPARACIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En ayunas de sólidos al menos 3 horas antes, puede tomar líquidos.</li> <li>• Higiene personal.</li> </ul>
<b>ANESTESIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Local.</li> </ul>
<b>DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apretar el punto de acceso en la vena del brazo al menos 10 minutos</li> <li>• Retirar los apósitos en 6-8 horas.</li> <li>• No realizar deporte ni actividades físicas intensas hasta al menos 7 días después del procedimiento.</li> <li>• Si tuviera dolor podrá tomar un analgésico (paracetamol), excepto en caso de alergia al mismo.</li> <li>• En caso de dolor intenso o fiebre acudir al servicio de Urgencias del hospital</li> </ul>
<b>INGRESO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No</li> </ul>