

**TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES OPORTUNISTAS (VIRUS) EN LOS ENFERMOS
INFECTADOS POR EL VIH**

Microorgan. <u>Virus</u>	Localizac.	Tto. infección activa		Tto. Quimioprolifático (Qmx)	
		De elección	Alternativo	De elección	Alternativo
Citomegalovirus	Retina	VALGANCICLOVIR 900 mg q12h VO x14-21 d	CIDOFOVIR 5 mg/kg/sem IV x2 sem	<u>Qmx 1^a (B) y 2^a</u> VALGANCICLOVIR 900 mg q24h VO (C)	GANCICLOVIR 5-6 mg/Kg q24h IV x5/sem ó 10 mg/Kg q24h IV x3/sem ó FOSCARNET 100-120 mg/Kg q24h IV x5/sem ó CIDOFOVIR 5 mg/kg q2 sem IV (D)
	Gastrointest inal Biliar Sistémica Pulmón SNC/P	ó GANCICLOVIR 5 mg/Kg q12h IV (perfundir en >1h) x14-21 d ó FOSCARNET 60 mg/Kg q8h IV (perfundir en >2h) x14-21 d (A)			
Herpes zóster varicela	SNC Pulmón Piel multimet. Cután. disemin. Trigeminal Varicela	ACICLOVIR 12,5 mg/Kg q8h IV (perfundir en >1h) x7-14 d	FOSCARNET 40 mg/Kg q8h IV (perfundir en >2h) x2-4 sem	<u>NO Qmx</u>	
	Otras localizac. (Formas leves)	ACICLOVIR 800 mg, 5 veces q24h VO x7 d			
Herpes simple	F. grave orolab.	ACICLOVIR 5 mg/Kg q8h IV (perfundir en >1h)	FOSCARNET 40 mg/Kg q8h IV (perfundir en >2h) x3 sem	<u>Qmx 2^a</u> ACICLOVIR 200 mg	FOSCARNET 40 mg/Kg

	Esófago Genital Anorrectal SNC	x7 d o ACICLOVIR 800 mg, 5 veces q24h VO x7 d		q8h VO (E)	q24h IV x5/sem
	Formas leves	ACICLOVIR 200 mg, 5 veces q24h VO x10 d			

(A) Si retinitis con riesgo de ceguera (afectación perimacular), añadir implante intraocular de GANCICLOVIR al tratamiento sistémico.

(B) Considerar Qmx 1ª si infección por CMV si PCR-CMV positiva en sangre y $CD4+ < 50/mm^3$.

(C) Puede interrumpirse la Qmx cuando se logre una recuperación inmunológica estable ($CD4+ > 200/mm^3$).

(D) Administrar PROBENECID 2 g VO antes de la infusión IV de CIDOFOVIR, y 1 g de PROBENECID 2h y 8h después de dicha infusión (administrar 1 litro de suero salino IV 1h antes de la infusión IV de CIDOFOVIR, y vigilar estrictamente la función renal).

(E) Puede estar indicada la Qmx 2ª de HSV si aparecen recidivas muy frecuentes, y mientras persiste el deterioro inmunológico.