

PROFILAXIS QUIRÚRGICA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA

TIPO CIRUGÍA	ANTIBIÓTICO DE 1ª ELECCIÓN	ALERGIA A ANTIBIÓTICOS DE 1ª ELECCIÓN
LIMPIA: Cirugía de cara, estapedectomía, amigdalectomía, adenoidectomía, miringotomía, microcirugía laríngea y cervicotomías sin apertura de vías aerodigestivas con duración inferior a 90 minutos.	NO PROFILAXIS (1)	-
LIMPIA-CONTAMINADA: Cirugía de senos paranasales (salvo la realizada en episodios agudos), miringoplastias, timpanoplastias, septoplastias y septorrinoplastia.	CEFAZOLINA 1 g IV en la inducción anestésica	VANCOMICINA 1 g IV en la inducción anestésica.
CONTAMINADA: Cervicotomías ó laringuectomías con duración > 90 minutos ó abertura de vías aerodigestivas.	GENTAMICINA 240 mg + CLINDAMICINA 600 mg I.V. en la inducción anestésica (2).	AMOXICILINA-CLAVULÁNICO 1 g IV en la inducción anestésica (3)

(1) En caso de pacientes inmunodeprimidos ó en los que se realicen implantes, se administrará Cefazolina 1 g IV y en caso de alergia Vancomicina 1 g IV.

(2) Si la intervención dura más de 6 horas administrar nueva dosis de Clindamicina 600 mg.

(3) Si la intervención dura más de 6 horas repetir nueva dosis.

Las dosis postoperatorias son innecesarias