

## QUIMIOPROFILAXIS EN TUBERCULOSIS

MANTOUX	INDICACION	PAUTA	ALTERNATIVA
POSITIVO *	<ul style="list-style-type: none"> <li>- &lt;25 años</li> <li>- Independientemente de la edad:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• convivientes y contactos al caso indice</li> <li>• Conversiones tuberculinitas en los 2 ultimos años</li> <li>• Portador VIH</li> <li>• Inmunosupresion o tratamiento inmunosupresor</li> <li>• Factores de riesgo previos (diabetes, neoplasias, silicosis, malnutrición, alcoholismo..)</li> <li>• Lesiones fibrotica en Rx con cultivo negativo, sin tratamiento previo y sin signos de progresión radiologica</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>ISONIACIDA:</b></p> <p>Adultos: 300 mg/día durante 6 meses</p> <p>Niños: 10 mg/kg/peso/día durante 6 meses</p>	<p><b>RIFAMPICINA:</b></p> <p>Adultos: 600 mg / día durante 6 meses.</p> <p>Niños 10 mg /Kg /peso/ día durante 6 meses.</p>
NEGATIVO **	<p>.- Menores de 15 años, iniciar QP en contactos de alto riesgo. Repetir mantoux a los 2 meses. Si negativo suspender QP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mayores de 15 años, repetir Mantoux a los 3 meses. Si negativo: suspender seguimiento</li> <li>-</li> </ul>		

\*  $\geq 5$  mm de induración de diámetro transversal en no vacunados y  $> 14$  mm en vacunados

\*\* Confirmar la negatividad para descartar el efecto Booster, repitiendo el Mantoux a los 7 días en vacunados, inmunodeprimidos y mayores de 55 años.