

	<p>CONSIDERADA: felación con eyaculación salpicadura de semen en conjuntiva</p> <p>NO RECOMENDADA: felación sin eyaculación cunnilingus</p> <p>2.- Fuente desconocida frente a VIH: Cuando sea posible se establecerá el estado de seropositividad de la pareja. Si no es posible considerar el grupo de riesgo de la misma. El agresor sexual se considerará siempre grupo de riesgo.</p> <p>A.- Fuente perteneciente a un grupo ó área con alta prevalencia VIH:</p> <p>RECOMENDADA: sexo anal receptivo</p> <p>CONSIDERAR: sexo anal insertivo</p> <p>CONSIDERAR: sexo vaginal receptivo</p> <p>CONSIDERAR: sexo vaginal insertivo</p> <p>CONSIDERAR: felación con eyaculación</p> <p>B.- Fuente no perteneciente al grupo o área de alta prevalencia a VIH</p> <p>CONSIDERAR: sexo anal receptivo</p> <p>NO RECOMENDADA sexo anal insertivo</p> <p>NO RECOMENDADA sexo vaginal receptivo</p> <p>NO RECOMENDADA sexo vaginal insertivo</p> <p>NO RECOMENDADA felación con eyaculación</p>
--	--

*

Bibliografía: Documento de Consenso sobre Profilaxis postexposición ocupacional y no ocupacional en relación con el VIH, VHB y VHC en adultos y niños. Marzo 2015. Obtenido en <http://www.seimc.org/contenidos/gruposdeestudio/gesida/dcientificos/documentos/2015/gesida-guiasclinicas-2015-Profilaxispostexposicion-VIH-VHC-VHB.pdf> [consultado: 26 junio 2015].

Comisión de Infecciones y Política de Antibióticos