


Malaria en adultos: algoritmo en Urgencias



¹**Criterios de gravedad (OMS modificada):** Ver tratamiento paludismo HUPA.

² Inmunodeprimido, infección VIH con mal control inmunológico, embarazada, DM, >60 años.

³**Tratamiento ambulatorio de 1ª elección:** Dihidroartemisina-Piperaquina (Eurartesim®) 40mg/320mg ajustado a peso. Ver tratamiento paludismo HUPA.

⁴**Tratamiento para ingreso de 1ª elección:** Dihidroartemisina-Piperaquina (Eurartesim®) 40mg/320mg ajustado a peso. Si presenta intolerancia oral o criterios de gravedad, Artesunato intravenoso. Ver tratamiento paludismo HUPA.

Si *P. ovale* o *P. vivax* añadir Primaquina (Primaquine®) 7.5 mg. Ver tratamiento paludismo HUPA.

Consultor Medicina Tropical: Dr. G. Rojo IF 2635/Dr J. Balsa IF 2552

Bibliografía: Am J Trop Med Hyg 2005;72:21-5; Eur J Microbiol Infect Dis 2006;26:181-8; Enf Inf Microbiol Clin 2008;26:282-4; Enf Inf Microbiol Clin 2015;33:e1-e13
Malaria J 2016;15:312;