

AZUL DE PRUSIA



Presentación

- ❖ Nombre comercial: ANTIDOTUM THALLI 500mg caps.
- ❖ Principio activo: Azul de Prusia (ferrocianuro férrico)

Indicación

- ❖ La intoxicación por Talio se considera cuando la ingesta de talio es superior a 4 mg/kg, que los niveles en sangre son superiores a 0,2 mg/l o que la excreción urinaria es superior a 10 mg/24 h.

Dosis habitual por vía parenteral adultos

- ❖ Administrar 10 g/8h en 50 ml de manitol 20% durante 10 días por vía oral o por sonda nasogástrica.

Dosis habitual por vía parenteral pediátrica

- ❖ Misma que adultos.

Vía de administración

VÍA ORAL

Preparación

- ❖ En pacientes en estado crítico que no pueden tragar, las cápsulas se pueden abrir y administrar por sonda duodenal o nasogástrica
- ❖ Las cápsulas se pueden abrir y mezclar con alimentos o líquidos suaves.
- ❖ Administrar con alimentos para estimular la excreción de cesio o talio. Aumente la fibra dietética o tómela con un laxante de fibra para disminuir el estreñimiento.

Observaciones

- ❖ El azul de Prusia está contraindicado en caso de hipersensibilidad al azul de prusia, constipación e íleo paralítico.
- ❖ Tiñe de azul oscuro las heces.
- ❖ Produce estreñimiento.
- ❖ Sus características organolépticas pueden dificultar su ingesta por vía oral.

Conservación y Estabilidad

- ❖ No conservar a Tª superiores a 25 °C

Localización

- ❖ SUMMA

Bibliografía

- ❖ Guía de administración de Antídotos:
file:///C:/Users/51140838Q/Downloads/Dialnet-GuiaDeAdministracionDeAntidotos-545633.pdf
- ❖ Ficha Técnica medicamento extranjero: <http://www.agemed.es/>
- ❖ UPTODATE