

¿Qué es y para qué se utiliza?

Medicamento: Anfotericina B liposomal.

Nombre comercial: Ambisome 50 mg polvo.

Excipientes: contiene sacarosa.

Indicación: Ambisome® es un medicamento que se utiliza en la prevención de infecciones producidas por hongos.

Dosis habitual: la dosis es variable según la situación clínica.

¿Cómo se administra?

- ✓ Se administra por vía NEBULIZADA con ayuda de un nebulizador especial.
- ✓ Reconstituir el vial de Ambisome® con 12 ml de agua estéril; agitar el vial DE FORMA VIGOROSA durante un tiempo de 30 segundos aproximadamente hasta obtener una dispersión amarilla translúcida. No utilizar si se advierte alguna precipitación de materia extraña. A continuación, extraer 6 ml del vial reconstituido y cargar la cámara del nebulizador.

Una vez reconstituido, el vial de Ambisome® es estable 1 semana conservado en NEVERA, por lo que los 6 ml restantes podrán ser utilizados en la siguiente nebulización, siempre que su pauta de administración sea cada 48 horas o semanal. Después de sacar de la nevera, atemperar el vial antes de cargar la cámara del nebulizador.

Desechar todo resto de solución sin usar que quede en el nebulizador tras el tratamiento.

- ✓ Almacenamiento de los viales NO reconstituidos: Temperatura inferior a 25° C.

Posibles reacciones adversas

- ✓ **Las reacciones adversas más frecuentes son:** Dificultad para respirar, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, dolor de cabeza.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado, informe a su médico o farmacéutico.

¿Cómo se debe conservar?

- ✓ Mantenga la medicación fuera de la vista y alcance de los niños.
- ✓ Conservar a temperatura ambiente, no superior a 25°C. Una vez reconstituido el vial es estable una semana en nevera.

Y recuerde...

- ✓ Tome su medicación exactamente como le ha indicado su médico.
- ✓ Informe a su médico o farmacéutico de los medicamentos que está tomando, incluso los adquiridos sin receta y consulte antes de comenzar a tomar una nueva medicación.
- ✓ Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarles aunque tengan síntomas similares a los suyos.
- ✓ No utilice estos medicamentos una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase).

Horario y normas para la dispensación en farmacia



- El horario establecido para la dispensación de medicamentos es lunes, miércoles, jueves y viernes de 8:00 a 14:45, los martes de 8:00 a 17:20. El primer martes de mes se abrirá de 8:00 a 19:45 h. Rogamos se ajusten al horario establecido.
- Para recoger su medicación es **IMPRESINDIBLE** venir con una receta debidamente cumplimentada y firmada por el médico prescriptor así como la tarjeta sanitaria. La receta ha de estar en vigor, **su duración es de 6 meses o 4 dispensaciones**.
- La recogida de medicación puede realizarla cualquier familiar o allegado al paciente, siempre que traiga la tarjeta sanitaria del paciente y **LA RECETA EN VIGOR**.
- En cada dispensación se entregará la medicación necesaria para 1 MES, salvo excepciones. Se debe acudir a recoger su medicación de 5 a 7 días antes de que se le termine.
- Devuelva a farmacia toda la medicación no utilizada una vez finalizado el tratamiento.
- Si tiene alguna duda acerca de la medicación, pregunte por el **FARMACÉUTICO** que le atenderá tan pronto como sea posible.

Teléfonos de contacto

91 1916721-7727
91 1917720-7721

Correo electrónico:

pexternosfarm@salud.madrid.org



Hospital Universitario
Puerta de Hierro Majadahonda

Comunidad de Madrid


Revisado febrero-2019

SERVICIO DE FARMACIA

AMBISOME® 50 mg

Polvo para nebulización

INFORMACIÓN AL PACIENTE



ATENCIÓN FARMACÉUTICA

Unidad de Pacientes Externos
Hospital Puerta de Hierro Majadahonda
c/ Manuel de Falla, 1 Majadahonda
Madrid

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO