

Zona principal de su cultivo, caracteres generales, sinonimia, etc.- Cepa característica de esta provincia; negra. Es un Cabernet Sauvignon. Conjunto foliar bien lobulado (en 5) al Cabernet con agujeros, o Verdejo negro (que ~~Sinonimia~~ puede ser de Zamora o Tinto Agudillo o Prieto Picudo. Se pone amarillento onza en otoño y se mantiene muy bien el follaje; acaba <sup>bien</sup> carminado.

Vigor Bueno, porte rastrero.

Brote <small>(Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas)</small>	Capullo	Brota tarde. Blanco gamuza las puntas. Capullo de blanco verdoso de bordes <u>marcados rosa. con zarcillos</u>
	Primeras hojitas	
Madera, etc. Sarmientos <small>(Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas)</small>	Agostados	Madera zarcillosa, rojizo-parda, dura en ramillos, par- duzcosa franca en general, estriosa, áspera. Entrenudos ( medios y rectos, desiguales, nudos poco salientes, algo
	Tiernos	( aplanados. Yemas algo aplanadas pero apuntadas.
	Zarcillos	Largos y delgados, bifurcados.
Hojas <small>(Aspecto general del conjunto del follaje, época de caída de las hojas y coloración que toman en el otoño)</small>	Hojas grandes (forma y dimensión)	( Hojas como se ha dicho (ver Cabernet Sauvignon), cara inferior verdosa asperosa ( de seco tacto
	Hojas pequeñas (forma y dimensión)	
	Peciolos <small>(forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo)</small>	Casi perpendiculares al limbo.
	Seno peciolar	Abierto en U.
Flor <small>(Epoca de floración y caracteres de la flor)</small>	Epoca de vendimia	
	Racimos	Pequeños y alados o en hombros; pedúnculo vinoso carmin. Como Cabernet-Sauvignon el resto.
Fruto	Granos	Uva elipsoide negra como Agudillo, Prieto Picudo, con pruinés, tamaño medio, gordos y apretados. Buena clase para vino fino, cepa de calidad a tipo Cabernet. Pincel vinoso.
	Pepitas	(Pedicelo poco verrugoso, anillo poco saliente y (verrugoso.

Observaciones generales. Defoliación carminosa vinoso, de grandes manchas Con Neruca hace una excelente mezcla para vino, tambien así (Parduca Neruca 30% a 40% (Martino 10% a 20% (Alba y Herradilla 10% a 15%.

En poda de vara dará muy buen fruto. Raíces pivotantes, lisas y delgadas.



Parduca  
(1197)



*Senlender-Parduca-*

Zona principal de su cultivo , caracteres generales, sinonimia, etc.- Cepa negra bien típica y antigua de las de esta Provincia (ver notas generales) que con Parduca (n) y Martino (b) son las de más producción. Tipo a Verdejo negro de Valladolid o este mismo. Tiene analogía con el Negrón de Asturias igualmente, o como una forma o casta a Graciano, pues a todas estas cepas recuerda. Conjunto foliar de quinque-trilobados redondeados, de manchas vinosas en otoño, algunas **son** hojas redondeadas por su dentado, rugosas y pequeñas.

Vigor Bueno, porte semi-erguido o rastrero en franca. Descorteza a tiras.

Brote  
(Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas)

Capullo Brota tarde, blanquecino-verdoso, gordo, borroso de gamuza en extremo ramo, de pelos diseminados. Las primeras hojitas y aun Primeras hojitas (parte del capullo dan acumines verdosos lucientes (muy señalado esto en las primeras hojitas). Primeras hojitas Agostados (blanco gamuza.

Sarmientos  
(Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas)

Su madera es a rojiza en ramillos y extremos varas (sin llegar a Graciano al que se parece) estriosa, áspera, de ramificaciones cortas. Entrenudos de 10 a 12 cm. como Verdejo negro Yemas redondeadas, con cabeza de borra -algunas- blanca, pequeñas.

Zarcillos Delgados y largos, bifurcados o trifurcados.

Hojas  
(Aspecto general del conjunto del follaje, época de caída de las hojas y coloración que toman en el otoño)

Hojas grandes (forma y dimensión) Quinquilobadas; en las pequeñas se da mucho el entero; es como un Casconil de Leon Aserrado menudo de dientes, textura rugosa. Envés de nervaduras verdosas, algo pedregosas, como en cara superior. En las formas de hojas hay una gran variación. Muchas hojas dan ondulado típico.

Hojas pequeñas (forma y dimensión)

Peciolos (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo) Cortos, casi perpendiculares al limbo.

Flor  
(Época de floración y caracteres de la flor)

Seno peciolar En V.

Fruto

Época de vendimia Tardía

Racimos Cónico-alados, pequeños, de pedúnculo corto-leñoso, simples y ahorquillados.

Granos Algo elipsoides con pruiné, apretados, pedicelos poco verrugosos, pero sí lo es el anillo.

Pepitas 2 a 3.

Observaciones generales. Muy buen vino fino sale de esta variedad que sazona muy bien aquí y es magnífica para unir a Parduca. No es de tanta producción como Nedano.

Defoliación amarillenta muy poco carminosa; diríase de uva blanca. Esta variedad da analogías al Mollar de Palencia y conviene señalarlo para comprobarlo allí.



*Neruca*  
(1196)



*Sontander-Neruca-*