

Zona principal de su cultivo, caracteres generales, sinonimia, etc. - Cepa blanca muy productiva y de desarrollo. Se consideran dos tipos: blanco y rubio según color; uno es como Treixadura o Verdallo (el blanco). Es una especie de Verdejo Nava blanco (con diferencia en envés hojas blanquinoso, más Sinonimia gordas y más porte erguido), o Chenil Blanco, Meslier, Maturana de Alava, Lúscar de Gerona, Serradillo de Leon, Plant Vert d'Ay (Champagne), Altesse de Savoie, Sauvignon del Jura, & Verdallo (pero no es). Es el Albillo de Toro. Es cepa portuguesa tambien muy cultivada en Alentejo! Botón de Gallo! Godinho o Agudelho, y tambien Godinho de Algarbe. Cepa fa-(a) Vigor Regular o bueno. Porte semi-erguido que le separa bien de Verdejo.

|   |  |   |
|---|--|---|
| Brote<br>(Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas)   | Capullo  | Brote blanco-rosa, <sup>vivo, caramelo</sup> destacadísimo como los albilllos de Madrid, escarchoso. Es rosa vivo todo él, que es algo verdoso con arañoso pelo ligero en ramos verdes, liso. - (b)   |
| Sarmientos<br>(Lángitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas)                             | Primeras hojitas   | De puntita <sup>ovícola yosa aguda</sup> rizada, barnizadas acarameladas; de envés blanquecino a gamuza y en las grandes ese verdoso solo grisáceo rugosas, no dan el granate de Verdejo, diferenciándose bien (c)  |
| aderos, etc.  | Argostados   | Los ramos parecen ya obscurarse en los rebrotos. Como marcando el paso a carminosos. Madera dura, teja-carminada o parduzca. Entrenudos rectos, medianos de 8 a 9 cms., cilíndricos <sup>apuntado</sup> . Nudos poco salientes con tinte muy marcado. Yemas pequeñas, redondeadas; medula regular color barquillo. En ramillos madera roja franca. - <sup>rama gruesa</sup> |
| Tiernos   | Zarcillos  | Limpios, verdosos, trifurcados, rizos, se ensortijan mucho los ramos; no muy desarrollados. <sup>Con cencerro que - muy leñoso</sup>  |
| Hojas<br>(Aspecto general del conjunto del follaje, época de caída de las hojas y coloración en el otoño) | Variables, cuinque algunas o enteras, lo general trilobadas de Hojas grandes <sup>(forma y dimensión)</sup> lóbulos cortos a redondos y no muy redondeados marcas dientes; tan anchos como largos, no destacados; verde luciente arriba, claro mate abajo o con peloso tan fino primero, luego como ya dicho en las hojas grandes viejas. No se ponen (granate como el Verdejo). |   |
| Flor<br>(Epoche de floración y características de la flor)  | Hojas pequeñas <sup>(forma y dimensión)</sup>  | Al entero aramón o trilobadas, de seno peciolar más a lo Rupes-tris Lot.  |
| Fruto   | Peciolas <sup>(forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo)</sup>   | De pelos ásperos, carminados, color que no continua en las nervaduras, que siguen verdes.   |
|   | Seno peciolar  | En V abierta poco larga en hojas grandes, y más de Lot en algunas hojas más pequeñas y primeras hojitas. Muy abierto en todas las hojas en general. Es de los más abiertos en V.  |
|   | Florece en fin junio y madura <sup>apretado</sup> fin agosto o primeros septiembre. Liga bien.   |   |
|   | Epoca de vendimia  |   |
|   | Racimos  | (Simples, alargado, <sup>apretado</sup> elipsoide) como Verdejo; largo pedúnculo verdoso, corto-correoso, lampiño, medios o pequeños. (Pedicelos leñosos, verrugosos dorados y así anillo saliente)   |
|   | Granos   | (te. Uva blanca (verdosa) menos que Verdejo (sazona en dorado) (como Verdejo Gris), algo transparente, picuda de (Verdejo típico de Nava, muy igual, y gusto dulce-ácido saboroso)  |
|   | Pepitas  | (liente y agradable; dorea al sol. Uva igual tambien a Alcabril, apuntada. Son variedades de uva a forma Godello (y tempranas Mateu, Allaren, Fardiz, Blancutiffo, Serradillo)  |

#### Observaciones generales.

Defoliación amarillenta onza oro y pecas negruzcas (las que no da Verdejo Nava). Pasable resistencia a mildiu y oidium. Va muy bien con Riparia y Rupestris. Se pudre bastante por muy apretada.

Zona principal de su cultivo, caracteres generales, sinonimia, etc.-

- (a).-(mosa y de las más antiguas en la Provincia, de la que se obtiene el famoso vino Tostadillo, vino blanco tipo Porto de 15° a 16° que así se llama por secarse la uva al Sol para ganar grado y dulzor. Es un follaje a lo Prieto Picudo, muy verde y persistente, de pelos ásperos, típico ésto en hojas viejas grandes (no tanto en las pequeñas y medianas), en parenquima arriba y abundantes abajo y en pecíoles y nervaduras que no tienen color carminado en base (como en Prieto Picudo). Conjunto foliar a trilobados (o quinculobados) algo redondeados, lóbulos muy marcados por ser senos abiertos de lóbulos separados, poco hondos, algo rugoso (lo que no es Verdejo). El pelo crece con la edad y no cae (al revés que lo otro), y en otoño toma color amarillo canario con manchas de hoja seca. Todo el follaje verde arriba con brillo y abajo mate, más oscuro arriba. (Es la uva típica de Valdeorras. Dentado poco marcado. Es la Tyrixdura blanca o gentil aromática!)

## Vigor

## Brote

(Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas).

Agostados

## Sarmientos

(Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas).

- (b).- (Todo rizadito por los acumines caramelosos alternantes que tiene. Brota pronto; Cuando Chasselas y antes que Caiño.

## Tiernos

- Zarcillos (c).- (enteras con seno peciolar de Lot o V abierta, de dientes pequeños agudos. Las pequeñas de junto (a brote y las de ramillo axilar son muy pequeñas y de seno peciolar claro de Lot (muy típico ésto) blanco gamuza abajo y arriba. Las segundas-primeras hojitas forman a hojitas de chopo, escarchoso (en envés y parte superior. Nervaduras verdosas.

Hojas grandes (forma y dimensión)

## Hojas

(Aspecto general del conjunto del follaje, época de caída de las hojas y coloración que toman en otoño).

Hojas pequeñas (forma y dimensión)

Pecíolos (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo)

Seno peciolar

## Flor

(Época de floración y caracteres de la flor)

Época de vendimia

- Racimos (d).- (lo, Gendre Blanc, Verdejo ya dicho, Meslier Hatif, Chenin Blanc, entre otros, datos que consigamos por ser de interés, aparte lo dicho, de sinonimia. Alba menor. Berdeles tipo Veldenes.

## Fruto

Granos

Pepitas

- (Otra diferencia con Verdejo es que éste no tiene (como el Verdejo, granillos chiquitines mezclados (con los grandes.

Ventosa transparente.

## Observaciones generales.

Es una cepa servil (descripción). Alba menor. Forma hoja entre Matrona y Verdejo.

Ver Lem-Lugo etc



Oriego Godella

f. vato. comu Verdejo (Verlo)