



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS  
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA  
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

A L A R I J E (COLCHICINA)  
=====

SUMIDAD.- A. globosa, vellosa, bordes carminados. B. globosa, arañosa, bordes carminados:

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Plegada hacia el haz, haz y envés arañoso, verde amarillento.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Algo plegada al haz, arañosas, verdes.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular, contorno liso, totalmente glabro, parcialmente verde con algunas rayas rojas.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 000101101101101101101101

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Pentagonal, grande, seno peciolar en U abierta, pentalobulada, seno lateral superior en lira cerrada, seno lateral inferior en lira cerrada, haz glabro, envés arañoso, con 5 nervios, limbo plegado, lobulos plegados, angulo del vertice del lobulo terminal casi obtuso, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, nervios de primer orden sobre el haz verdes, dientes de lados convexos de color verde fuerte con algo de brillo, limbo medio, nervios de orden 5º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Medio, medio, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- De postrada a erguida.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Medio, medio, pedunculo visible, agostado hasta la primera ramificación, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, tamaño irregular, color verde blanco, con pruina, coloración regular, forma esferoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel gruesa, pulpa carnosa-jugosa, sabor neutro, pedicelo largo de color verde, rodete evidente de color verde, pincel corto color amarillo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 3. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde con manchas oscuras.



SARMIENTO.- 209 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza desprendida, en algún sitio, sección transversal circular, superficie con estrias, sin pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 11,5 cm., de color pardo rojizo con zonas más claras, yemas conicas.

TRONCO.- Potente.



ALARIJE. (Colchicina)

B V



15. F. 75 2002

