



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

A L B A R R A Z
=====

SUMIDAD.- A. media, vellosa, blanca. B. media, vellosa, verde-blancu-
cino.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz arañoso, envés afelpado, -
dientes glabros, verde amarillento.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz arañoso, envés más arañoso
verde claro.

SARMIENTO HERBACEO.- Sin lenticelas, sección transversal circular, con
torno con costillas, algo arañoso, más zona terminal, verde rojizo, nū-
dos más rojos.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 01101101101101101101101101101.

FLOR1- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Cuneorbicular, grande, seno peciolar en U, pentalobulada
seno lateral superior en V, seno lateral inferior en V, haz glabro, en-
vés arañoso, haz y envés de 5 nervios arañoso, limbo plano, lóbulos --
planos, ángulo del vértice del lóbulo terminal recto, superficie lisa,
nervios de primer orden sobre el envés parcialmente rojo, nervios de -
primer orden sobre el haz verde con alguna mancha roja, dientes de la-
dos rectos y convexos, de color verde fuerte, con brillo, limbo grueso,
nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, grueso, arañoso, sección poco evi-
dente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrada.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Grande, medio, pedúnculo visible,
semiagostado, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.


BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Grande, tamaño regular, color verde-blancu-
co, con pruina, coloración irregular, forma casi esférica, ombligo per-
sistente, sección transversal circular, zumo incoloro, piel media, pul-
pa carnosa, sabor neutro, pedicelo largo, de color verde, rodete evi-
dente, de color verde, pincel medio, de color transparente, separación
difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 3. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde.

SARMIENTO.- 206 cm. de largo, fuerte, muy ramificado, corteza despren-
dida a tiras, sección transversal algo aplastada, superficie con es-
trias, parcialmente poca pruina, nudos salientes, totalmente glabro,
entrenudos de longitud media 7,80 cm. de color marrón oscuro, zonas -
muy claras, yemas cónicas algo dardo.

TRONCO.- Potente.



12-46

