



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS  
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA  
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

C H I N C H I L L A N A  
=====

SUMIDAD.- A. media, afelpada, verde blanquecino. B. media, vellosa, verde blanquecino.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz vellosa, más el envés, dientes glabros, verde blanquecino, bordes carmín.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz arañoso, envés vellosa, verde.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular, contorno con estrias, poco marcadas, arañoso, final vellosa, verde, nudos y rayas rojizas.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 00110110110.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Pentagonal y cuneorrbicular, grande, seno peciolar en parentesis, pentalobulada, seno lateral superior en lira, seno lateral inferior en lira y V, haz algo arañoso, envés acerdado, haz y envés de 5 nervios acerdados, limbo torcido, lóbulos torcidos, ángulo del vértice del lóbulo terminal agudo, superficie estampada, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, nervios de primer orden sobre el haz verde con punto peciolar rojizo, dientes de lados rectos y convexos, de color verde, poco brillo, limbo grueso, nervios de orden 4ª no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, medio, acerdado, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Erguida.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Medio, medio, pedúnculo visible, casi agostado, longitud relativa 1/3. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, tamaño irregular, color azul oscuro, con mucha pruina, coloración regular, forma esferoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa blanda, sabor neutro, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente, de color algo rojizo, pincel medio, de color rojizo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Rojo.

SARMIENTO.- 190 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza adherente, algo rajado, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos poco salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 10,00 cm. de color beige amarillento, manchas marrones, yemas cónicas.

TRONCO.- Potente.

