



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS  
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA  
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

ESCOBERA  
=====

SUMIDAD.- A. media, vellosa, blanca. B. media, vellosa, verde blanquecino.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz vellosa, envés afelpado, dientes glabros, verde amarillento, bordes rojizos.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, algo plegadas al envés, haz arañoso, envés vellosa, verde.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular, contorno con estrias poco marcadas, arañoso y final bastante vellosa, verde con nudos y rayas rosa oscuro.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 0110110110110.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Cuneorbicular, grande, seno peciolar en lira, pentalobulada, seno lateral superior en parentesis bordes superpuestos, seno lateral inferior en lira y V, haz glabro, envés arañoso, haz y envés de 5 nervios acerdados, limbo plano, lóbulos planos, ángulo del vértice del lóbulo terminal agudo, superficie poco estampada, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, nervios de primer orden sobre el haz verde claro, dientes de lados convexos, de color verde, poco brillo, limbo grueso, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, medio, acerdado, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Erguida.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Medio-grande, compacto, pedúnculo visible, herbáceo, longitud relativa 1/3-1/4. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, tamaño casi regular, color azul oscuro, con mucha pruina, coloración regular, forma esferoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa blanda, sabor neutro, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente, de color rojizo, pincel medio, de color rojizo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.-Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Roja.

SARMIENTO.- 236 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza se desprende algo, sección transversal aplastada, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos poco salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 8,8 cm. de color beige amarillento, manchas oscuras, yemas cónicas.

TRONCO.- Potente.

ESCOBERA

T V

12-60

