



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

J E R O N I M O
=====

SUMIDAD.- A. media, arañosa, verde amarillo, borde carminado. B. media-globosa, casi vellosa, verde amarillo.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- En canal hacia el haz, arañosa, verde pálido, con zonas cobrizas.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Plegada hacia el haz, glabra, verde pálido - metálico.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal elíptica, contorno liso, parcialmente arañoso, enteramente verde.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 0000001000000000

FLOR.- Ver fotografía.

HOJAS ADULTAS.- Orbicular, grande, seno peciolar en lira, pentalobulada, seno lateral superior en lira, seno lateral inferior en v, haz glabro, envés glabro, limbo plegado, lobulos torcidos, angulo del vertice del lobulo terminal agudo, superficie con ampollas, nervios de primer orden sobre el envés verdes, nervios de primer orden sobre el haz verdes, dientes de lados convexos de color verde oscuro con brillo, limbo no muy delgado, nervios de orden 4º no salientes, Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, grueso, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Erguida.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Grande, medio, son pedundulo visible, herbaceo, longitud relativa 1/3. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Grande, tamaño regular, color corinto oscuro, con pruina, coloración regular, forma discoide, con ombligo no persistente, sección transversal irregular, zumo incoloro, piel fina, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo largo de color verde, rodete evidente de color verde, pincel medio de color rojo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.





FOLLAJE EN OTOÑO.- Con grandes manchas pardas en haz y envés, peciolo con zona central rojiza no uniforme.

SARMIENTO.- 175 cm. de largo, fuerte, muy ramificado y grande, corteza adherente, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos salientes, totalmente glabro, con manchas rojas, yemas en dardo.

TRONCO.- Potente.

JERONIMO

T M



25-VII-A-20