



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

NEGRA BLASCO
=====

SUMIDAD.- A. media, arañosa, verde. B. abierta, algo arañosa, verde claro.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, arañosa el haz. menos el envés, - verde.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Plegadas al haz, haz arañoso, y nervios del, envés, verde.

SARMIENTO HERBACEO.- Sin lenticelas, sección transversal circular, contorno con costillas pronunciadas, glabro, con terminaciones arañosas, verde, con rayas oscuras, extremo más verde.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 001011001101101101.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Cuneorbicular, grande, seno peciolar en parentesis, pentalobulada, seno lateral superior en lira, alguno con diente, seno lateral inferior en lira ó V, haz glabro, envés glabro, nervios ligeramente acerdados, haz y envés de 5 nervios, limbo plano, lóbulos torcidos, ángulo del vértice del lóbulo terminal agudo, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde amarillento, nervios de primer orden sobre el haz verde claro, dientes de 3 clases, de color verde oscuro, poco brillo, limbo medio, nervios de 5º orden. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Medio, medio glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Erguida.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Grande, compacto no demasiado, pedúnculo visible, semiagostado, longitud relativa 1/6. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Gruesa, tamaño regular, color azul oscuro, con pruina, coloración regular, forma ovoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel gruesa, pulpa blanda, sabor insípido algo herbáceo, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente, de color rojo, pincel corto, de color rojo, separación fácil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 1-2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde con manchas rojo vinosas.

SARMIENTO.- 152 cm. de largo, no muy fuerte, ramificado, corteza poco desprendida, sección transversal circular, superficie con estrias, poca pruina, nudos algo salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media, 6,5 cm. de color amarillo grisáceo, algunas rayas y bandas marrones, yemas cónicas muy anchas en la base.

TRONCO.- Potente.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS	CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 06
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA
	NEGRA BLASCO
1.- SUMIDAD	A. media, arañosa, verde. B. abierta, algo arañosa, veđe claro.
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Extendidas, arañosa el haz, menos el envés, verde.
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Plegadas al haz, haz arañoso, y nervios del envés, verde.
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sin lenticelas, sección transversal circular, contorno con costillas pronunciadas, glabro, con terminaciones arañosas, verde, con rayas oscuras, extremo más verde.
5.- ZARCILLO	Intermitente. Fórmula: 001011001101101101.
6.- FLOR	Ver fotografía.
7.- HOJA ADULTA	Cuneorbicular, grande, seno peciolar en parentesis, pentalobulada, seno lateral superior en lira, alguno con diente, seno lateral inferior en lira ó V, haz glabro, envés glabro, nervios ligeramente acerados, haz y envés de 5 nervios, limbo plano, lóbulos torcidos, ángulo del vértice del lóbulo terminal agudo, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde amarillento, nervios de primer orden sobre el haz verde claro, dientes de 3 clases de color verde oscuro, poco brillo, limbo medio, nervios de 5º orden. Ver fotografía.
8.- PECIOLO DE LA HOJA ADULTA	Medio, medio glabro, sección poco evidente.
9.- PORTE DE LA VEGETACION	Erguida.
10.- RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL	Grande, compacto no demasiado, pedúnculo visible, semiagostado, longitud relativa 1/6. Ver fotografía.
11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL	Gruesa, tamaño regular, color azul oscuro, con pruina, coloración regular, forma ovoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel gruesa, pulpa blanda, sabor insípido algo herbáceo, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente, de color rojo, pincel corto, de color rojo, separación facil. Ver fotografía.
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 1-2. Ver fotografía.
13.- FOLLAJE EN OTOÑO	Verde con manchas rojo vinosas.
14.- SARMIENTO	152 cm. de largo, no muy fuerte, ramificado, corteza poco desprendida, sección transversal circular, superficie con estrias, poca pruina, nudos algo salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 6,5 cm. de color amarillo grisáceo, algunas rayas y bandas marrones, yemas cónicas muy anchas en la base.

110
SALIENTES



SEP • 70

