

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS	CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 06	
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA	
	P E D R O X I M E N E Z (COLCHICINA)	
1.- SUMIDAD	A. media, vellosa, bordes carminados. B. media, ve llosa, blanquecina.	
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Extendidas, haz arañoso, envés velloso, verde cla ro.	
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Extendidas, haz arañoso, envés velloso, verdes.	
4.- SARMIENTO HER BACEO	Sección transversal circular, contorno con costi llas, parcialmente acerado, parcialmente verde - con algo rojizo.	
5.- ZARCILLO	Intermitente. Fórmula: 000001101101101101101.	
6.- FLOR	Ver fotografía.	
7.- HOJA ADULTA	Pentagonal, grande, seno peciolar en lira cerrada, pentalobulda, seno lateral superior en lira cerra da, seno lateral inferior en lira cerrada, haz gla bro, envés velloso, con 5 nervios, limbo plano, ló bulos planos, angulo del vertice del lóbulo termi nal obtuso, superficie algo estampada, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, nervios - de primer orden sobre el haz verdes, dientes de la dos rectilineos de color verde fuerte, sin brillo, limbo grueso, nervios de orden 5º no salientes. - Ver fotografía.	
8.- PECIOL DE LA HOJA ADULTA	Medio, gureso, arañoso, sección poco evidente.	
9.- PORTE DE LA - VEGETACION	De rastrero a postrado.	
10.- RACIMOS CON - MADURACION IN DUSTRIAL	Grande, medio, pedúnculo visible, semiagostado, x- longitud relativa 1/3. Ver fotografía.	
11.- BAYA CON MADU REZ INDUSTRIAL	Gruesa, tamaño regular, de color dorado, con prui na, coloración regular, forma ovoide, ombligo per sistente, sección transversal regular, zumo incolo ro, piel gruesa, pulpa carnosa, sabor neutro, ped ícelo largo de color verde, rodete evidente de co lor verde, pincel corto de color amarillo, separa ción difícil. Ver fotografía.	
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya ninguna.	
13.- FOLLAJE EN - OTOÑO	Verde con manchas oscuras.	
14.- SARMIENTO	196 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza adhe rente, sección transversal circular, superficie - con estriadas, sin pruina, nudos salientes, totalmen te glabro, entrenudos de longitud media 8,4 cm. co lor pardo grisaceo uniforme, yemas puntiagudas.	
15.- TRONCO	Potente.	

15-E-25

INSTITUTO NACIONAL
DE
INVESTIGACIONES
AGRONOMICAS

CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES
AGRONOMICAS 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

PEDRO XIMENEZ (Colchicina)

