



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

B E N I T I L L O
=====

SUMIDAD.- A. media, arañosa, verde claro, manchas carminadas. B. media, arañosa, verde-blanco.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz arañoso, envés arañoso en los nervios, verde amarillento.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Plegadas al haz, haz algo arañoso, envés glabro, verde.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal cilíndrica, contorno muy estriado, algo arañoso, al final más, verde con alguna zona bronceada.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 0000011011011011011000011.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Pentagonal (base redondeada), mediana, seno peciolar en parentesis ó quilla, pentalobulada, seno lateral superior en lira, seno lateral inferior en parentesis, haz glabro, envés glabro, haz y envés de 5 nervios, limbo plagado al haz, lóbulos torcidos al haz, ángulo del vértice del lóbulo terminal agudo, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde, nervios de primer orden sobre el haz verde, dientes de lados rectos, de color verde, poco brillo, limbo fino, nervios de 4º orden, no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Medio, medio, glabro y algo rosado, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Poco erguido.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Grande, medio, pedúnculo visible, semlagostado, longitud relativa I/IO. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Gruesa, tamaño regular, color negro-mora, con pruina, coloración regular, forma casi esférica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo largo, de color verde. rodete evidente, de color verde, pincel mediano, de color rojizo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE ENOOTOÑO.- Verde rojizo, hojas rojas, nervios verdes.

SARMIENTO.- 158 cm. de largo fuerte, poco ramificado, corteza adherente, sección transversal circular, superficie con costillas, parcialmente con pruina, nudos aplastados, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 8,2 cm. de color amarillo rojizo, parcialmente, yemas redondeadas.

TRONCO.- Potente.

BENITILLO

T V



14-86

