

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS	CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 06
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA
	C H I R O N E S
1.- SUMIDAD	A. globosa, arañosa, verde blanquecino, algún borde bronceado. B. globosa, vellosa, entre blanco y verde.
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Extendidas, haz arañoso, envés más, verde.
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Algo plegadas al haz, haz arañoso, envés acerdado, verde.
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sección transversal circular, contorno con costillas, casi glabro. verde con muchas rayas rojas, al final rojo por un lado y verde por otro.
5.- ZARCILLO	Intermitente. Fórmula: 0011011011011.
6.- FLOR	Ver fotografía.
7.- HOJA ADULTA	Orbicular, mediana, seno peciolar en parentesis, pentalobulada, menos marcada, seno lateral superior en lira, alguna con diente, seno lateral inferior en V í lira, haz glabro, envés acerdado, haz y envés de 5 nervios, limbo algo plegado al haz, lóbulos torcidos, ángulo del vértice del lóbulo terminal obtuso, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde amarillento, alguno puntos peciolar rojo, nervios de primer orden sobre el haz verde amarillento, algunos puntos peciolar rojo, dientes de lados rectilíneos muy marcados, de color verde, poco brillo, limbo grueso, nervios de 4º orden, no salientes. Ver fotografía.
8.- PECIOLO DE LA HOJA ADULTA	Corto, grueso, acerdado, sección poco evidente.
9.- PORTE DE LA VEGETACION	Erguido.
10.- RACIMO CON MADURACION INDUSTRIAL	Medio, medio, pedúnculo visible, herbáceo, longitud relativa 1/5. Ver fotografía.
11.- BAYA CON MADURACION INDUSTRIAL	Media, tamaño irregular, color amarillo, muy poca pruina, coloración regular, forma ovoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa crujiente, sabor neutro (dulce), pedicelo medio, de color verde, rodete evidente, de color verde algo oscuro, pincel largo, de color amarillo, separación difícil. Ver fotografía.
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 1. Ver fotografía.
13.- FOLLAJE EN OTOÑO	Amarillo, rojizo con manchas pardas.
14.- SARMIENTO	119 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza se desprende, sección transversal aplastada, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos algo salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 5,6 cm. de color marrón, manchas rojizas, yemas cónicas algo vellosas.

15.-- TRONCO	Mediano. CASTRO REGIONAL DE AGRONOMIAS DE DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA CHIRIQUÍ	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
	A. glabros, verrucos, verde blanquecino, algún borde pronunciado. B. glabros, velludos, entre blanco y verde.	1.- UNIDAD
	Extendidas, haz arbores, envés verde.	2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES
	Algo plegadas al haz, haz arbores, envés verde.	3.- HOJAS JOVENES INFERIORES
	Sección transversal circular, envés con costilla lisa, casi glabra, verde con manchas rojas, al final rojo por un lado y verde por otro.	4.- SARMIENTO HERIDO
	Intermitente. Formas: COLICILIOLOLI.	5.- SARCILIO
	Ver fotografía.	6.- FLOR
	Orbicular, medianas, seno pedicelo, en periancia, pentálobas, nervos marcados, haz lateral superior en líve, algunos con dientes, haz lateral inferior en V líve, haz glabro, envés verde, haz y envés de 5 nervios, límbos algo plegados al haz, límbos los torcidos, ángulo del vértice del lóbulo terminal obtuso, superficie lisa, nervios de primer orden de verde amarillento, algunos puntos de color rojo, nervios de primer orden sobre el haz verde amarillento, algunos puntos pedicelo rojo, dientes de límbos rectilíneos muy marcados, de color verde poco brillante, límbos gruesos, nervios de 4 o 5, haz, no resistentes. Ver fotografía.	7.- HOJA ADULTA
	Corte, grueso, acorchado, sección poco evidente.	8.- SECCIÓN DE LA HOJA ADULTA
	Erguido.	9.- POSICIÓN DE LA HOJA
	Medio, medio, pedúnculo alabado, herbáceo, longitud	10.- RACIMO CON DURACION INDIVIDUAL
	Medio, hazo irregular, color amarillo, muy poco brillante, coloración regular, forma ovoide, ombligo periancia, sección transversal regular, hazo liso, hazo del medio, hazo crujiente, hazo neutro (de color) pedicelo medio, de color verde, robusto evidente, de color verde algo oscuro, hazo largo, de color amarillo, separación difícil. Ver fotografía.	11.- BAYA CON MADURACION INDUSTRIAL
	Número medio de semillas por baya. Ver fotografía.	12.- SEMILLA
	Amarillo, tejido con manchas verdes.	13.- POSICIÓN EN EL OTORO
	1.5 cm. de largo, hazo, ramillete, hazo de hazo, sección transversal plegada, hazo de hazo, peticelamente con hazo, hazo de hazo, totalmente glabro, hazo de hazo, hazo medio 2.5 cm. de color amarillo, hazo de hazo, hazo de hazo.	14.- SARMIENTO


1.58

Instituto Nacional  
de  
Investigaciones  
Agronómicas

Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

CHIRONES



OCT • 71

