



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

NAVES DE FITERO
=====

SUMIDAD.- A. media, arañosa, verde. B. media, arañosa, verde.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas ligeramente, plegadas hacia el haz, haz arañoso, envés glabro, verde, con ligero tinte bronceado.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Plegadas al haz, haz levemente arañoso, envés glabro, verde.

SARMIENTO HERBÁCEO.- Sección transversal cilíndrico, contorno con costillas leves, glabro, al final algo arañoso, verde con alguna zona bronceada, más en los nudos.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 0000100110011011011011011.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Orbicular o pentagonal, mediana, seno peciolar en quilla - abierta, pentalobulada, seno lateral superior en V, seno lateral inferior en V o parentesis con diente, haz glabro, envés glabro, haz y envés de 5 nervios, limbo plano, lóbulos planos, ángulo del vértice del lóbulo terminal obtuso, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde, punto peciolar rojizo, nervios de primer orden sobre el haz verde, punto peciolar rojizo, dientes de lados convexos, de color verde fuerte, con poco brillo, limbo medio, nervios de 5º orden, no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, medio, glabro, rosado, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Erguido.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Medio, medio pedúnculo visible, herbáceo, longitud relativa 1/3. Ver fotografía.


BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, tamaño irregular, color azul oscuro, mucha pruina, coloración regular, forma elipsoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media-gruesa, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel corto, de color rojizo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.



FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde rojizo y rojo.

SARMIENTO.- 109 cm. de largo, fuerte, sin ramificar, corteza adherente, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 7,4 cm. de color marrón claro, a bandas, yemas cónicas.

TRONCO.- Potente.



OCT • 70



1488

Instituto Nacional
de
Investigaciones
Agronómicas

Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

NAVES DE FITERO



OCT • 71

