


INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS	CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 06
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA
	A L B I L L O M A Y O R
1.- SUMIDAD	A. Globosa, velloso, verde blanquecino, manchas carminadas. B. Abierta, velloso, verde blanquecino, manchas rosas.
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Extendidas, haz arañoso, envés casi algodonoso, verde-blanco.
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Extendidas, haz algo arañoso, envés velloso, verde claro.
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sin lenticelas, sección transversal circular, contorno con pocas estrías no muy marcadas, parcialmente arañoso y final velloso, parcialmente rojo.
5.- ZARCILLO	Intermitente. Fórmula: 00011010110110110110110110110
6.- FLOR	
7.- HOJA ADULTA	Orbicular, mediana a grande, seno peciolar en U abierta en general, pentalobulado, seno lateral superior en lira cerrada con un diente muchas veces en el fondo, seno lateral inferior en lira abierta, haz glabro, envés velloso, haz y envés de 5 nervios glabros, limbo velloso, limbo algo doblado hacia el envés, lóbulos algo doblados hacia el envés (poco), ángulo del vértice del lóbulo terminal casi recto, superficie algo estampada, nervios de primer orden sobre el envés verdes, nervios de primer orden sobre el haz verdes, dientes de lados convexos, color verde botella, sin brillo, limbo más bien delgado, nervios de orden 5º no salientes.
8.- PECIOLO DE LA HOJA ADULTA	Medio, delgado, glabro, sección recta poco evidente.
9.- PORTE DE LA VEGETACION	Casi erguido.
10.- RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL	Medio, medio, pedúnculo visible, herbáceo.
11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL	Pequeña, tamaño regular, color ambarino, con pruina, coloración irregular, forma esferoide, ombligo persistente, sección transversal circular, zumo incoloro, piel gruesa, pulpa carnosa, sabor neutro, pedicelo medio de color verde, rodete -- evidente de color verde, pincel medio de color verde, separación media.
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 1.
13.- FOLLAJE EN OTONO	Verde.
14.- SARMIENTOS	2,88; 2,59; 3,51; 1,33 cms. de largo, fuerte, ramificado, corteza se desprende en tiras, sección transversal un poco aplastada, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos salientes, glabro, enteramente, velloso blanca, entrenudo de longitud media 6,8 cms., amarillento, de color a bandas oscuras, yemas cónicas, cordón peciolar estrecho, rectilíneo.
15.- TRONCO	Potente.



14-20

