



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS  
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA  
M A D R I D

B A L A D I  
=====

SUMIDAD.-- A. globosa, vellosa, blanco verdoso con muchas manchas carmin.  
B. globosa, vellosa, blanco verdoso con bordes carminados.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.-- Plegadas hacia el envés (algo), haz arafioso, envés vellosa, verde amarillento.

HOJAS JOVENES INFERIORES.-- Algo plegadas hacia el envés, haz arafioso, en vés vellosa, verde claro.

SARMIENTO HERBACEO.-- Sección transversal eliptica, contorno con costillas, parcialmente arafioso, enteramente verde.

ZARCILLO.-- Intermitente. Formula: 0011001011011011011011010

FLOR.-- Ver fotografia.

HOJA ADULTA.-- Pentagonal, grande, seno peciolar con bordes superpuestos - con dientes, pentalobulada, seno lateral superior en lira, seno lateral inferior en U, haz glabro, envés vellosa, con 5 nervios, limbo plano lóbulos torcidos, angulo del vertice del lóbulo terminal de agudo a obtuso, superficie fruncida en los nervios, nervios de primer orden sobre el envés verdes, nervios de primer orden sobre el haz verdes, dientes de lados rectilíneos de color verde sin brillo. limbo medio, nervios de 4º orden - no salientes. Ver fotografia.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.-- Largo, glabro, grueso, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.-- Postrado.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.-- Grande, medio, pedunculo visible, semiagostado, longitud relativa 1/5. Ver fotografia.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.-- Media, tamaño irregular, color amarillo, - con pruina, coloración regular, forma esférica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro piel gruesa, pulpa carnosa, sabor neutro, pedicelo medio de color amarillo verdoso, rodete evidente de color amarillo verdoso, pincel medio de color amarillo, separación difícil. Ver fotografia.

SEMILLA.-- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografia.

FOLLAJE EN OTOÑO.-- Amarillo, verde con zonas oscuras.

SARMIENTO.-- 160 cm. de largo, fuerte, muy ramificado, corteza adherente, sección transversal eliptica, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos salientes enteramente glabro, entrenudos de longitud media 6,1 cm. de color pardo rojizo con rayas oscuras, yemas cónicas.

TRONCO.-- Potente.

BALADI

B V

12-42

