



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS  
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA  
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

CLARETE BURDEOS  
=====

SUMIDAD.- A. globosa, algodonosa, bordes carminados. B. globosa, vellosa, amarillento.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz arafioso, envés algodonoso, verde claro.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, arafiosa, más en el envés, verde.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular irregular, contorno - liso, parcialmente arafioso, totalmente rayas rojas.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 001101101101101101101101101

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Pentagonal, de medio a grande, seno peciolar en lira, pen talobulada, seno lateral superior en lira casi cerrada, seno lateral inferior en V, haz glabro, envés arafioso, con 5 nervios, limbo plegado al haz, lobulos algo plegados, angulo del vertice del lobulo terminal obtuso, superficie con alguna ampolla, nervios de primer orden sobre el envés, un poco rojizos, nervios de primer orden sobre el haz un poco rojizos, dientes de lados convexos de color verde oscuro sin brillo, limbo medio-grueso, nervios de orden 5º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, medio, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrado-erguido.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Grande, compacto, pedunculo visible, agostado hasta la primera ramificación, longitud relativa 1/. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, tamaño irregular, color amarillo - verdoso, con poca pruina, coloración irregular, forma algo discoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo medio a largo, de color verde, rodete poco evidente de color verde, pincel medio de color amarillo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 3. Ver fotografía.


FOLLAJE EN OTOÑO.- Amarillo, nervios verdes.

SARMIENTO.- 122 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza muy adherente, sección transversal circular, superficie con estrias, sin pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 7,7 cm. de color pardo-rojizo con nudos más rojos, yemas cónicas.




TRONCO.- Potente.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS	CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 06
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA
	C L A R E T E D E B U R D E O S
1.- SUMIDAD	A. Mediana, vellosa, blanco con borde carminado. B. Abierta, arañoso, verde con borde carminado.
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Extendidas, arañoso, verde-blanco.
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Extendidas, arañoso, verde.
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sin lenticelas, sección transversal circular, contorno con costillas, arañoso enteramente, verde con rayas rojas parcialmente.
5.- ZARCILLO	Fórmula: 00110110110110110110110
6.- FLOR	Ver fotografía.
7.- HOJA ADULTA	Cordiforme, grande, seno peciolar en lira cerrada, pentalobulado, seno lateral superior en V, seno lateral inferior en lira, haz arañoso, envés vellosa, envés de 3 ó más nervios vellosa, limbo enrollado hacia el haz, lóbulos planos, ángulo del vértice del lóbulo terminal recto, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés rojos, nervios de primer orden sobre el haz rojos, dientes de lados convexos, color verde fuerte, sin brillo, limbo grueso, nervios de 4º orden no salientes.
8.- PECIOLO DE LA HOJA ADULTA	Corto, medio, arañoso, sección recta.
9.- PORTE DE LA VEGETACION	Postrado.
10.- RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL	Grande, suelto, con pedúnculo agostado hasta la primera ramificación.
11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL	Media, tamaño regular, color ambarino, con pruina, coloración regular, forma esferoide, ombligo persistente, sección transversal regular circular, zumo incoloro, piel media, pulpa blanca, sabor insípido moscatel medio, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel corto de color amarillo-verdoso, separación fácil.
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 2.
13.- FOLLAJE EN OTOÑO	Verde.
14.- SARMIENTO	138 cms. de largo, medio, poco ramificado, corteza adherente con lenticelas, sección transversal circular, superficie con costillas, con pruina, nudos globulosos, enteramente glabro, entrenudo de longitud media 8,5 cms. de color beige, nudos, yemas cónicas, cordón peciolar estrecho, perpendicular.

15.- TRONCO	Potente	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA	
		1 - JUMBAG
		2 - HOJAS JUVENES SUPERIORES
		3 - HOJAS JOVENES INFERIORES
		4 - SARMIENTO DE CACHO
		5 - SARMENTO
		6 - FLORES
		7 - HOJA ADULTA
		8 - RECIPO DE LA HOJA ADULTA
		9 - PARTE DE LA VEGETACION
		10 - RACIMOS CON INFLORACION INDUCIDA
		11 - BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL
		12 - SEMILLA
		13 - FOLIAJE EN OTRO
		14 - SARMIENTO



14-10



INSTITUTO NACIONAL  
DE  
INVESTIGACIONES  
AGRONOMICAS

CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES  
AGRONOMICAS 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

CLARETE DE BURDEOS

