



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

I T A L I A
=====

SUMIDAD.- A. abierta, lanosa-algodonosa, verde pálido. B. medio-glabro, vellosa, leonado.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Desplegadas, arañoso el haz, lanoso-algodonoso el envés, con regiones ligeramente bronceadas.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Algo plegado el haz, glabro en haz, vellosa en envés, verde.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal elíptica, algo aplastada, con torno liso, enteramente glabro, enteramente verde.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 0000001101101101101100100

FLOR.- Ver fotografía.

HOJAAADULTA.- Pentalobulada, casi cuneiforme, mediana, seno peciolar en lira, pentalobulada, seno lateral superior superpuesto, seno lateral inferior en lira, haz glabro, envés muy poco vellosa, limbo torcido, lobulos torcidos, angulo del vertice del lobulo terminal agudo, superficie ondulada, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, nervios de primer orden sobre el haz verdes, dientes de lados convexos de color verde fuerte sin brillo, limbo no muy grueso, nervios de orden 4º no salientes, Ver fotografía.

PEDILO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, medio, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Erguido.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Medio, suelto, pedunculo visible, herbaceo, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Gruesa, tamaño regular, color amarillo, con pruina, coloración regular, forma fusiforme, ombligo persistente (pequeñísimo), sección transversal regular, zumo incoloro, piel gruesa, pulpa jugosa, sabor moscatel, pedicelo medio de color verde, rodete evidente de color verde, pincel medio de color amarillo, separación difícil, Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 3. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Algo tostado en zonas grandes, pero no totalmente, con grandes zonas rojo oscuras.

SARMIENTO.- fuerte, ramificado, corteza adherente, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 8,20 cm. de color marrón claro con manchas, yemas cónicas.

TRONCO.- Potente.

25-111-6-7

