



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

CAIÑO GORDO
=====

SUMIDAD.- A. media, vellosa, algodonosa, casi blanco, manchas carmín, -
bordes algo bronceados. B. casi globosa, entre vellosa y algodonosa, -
blanco algo verde.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Algo plegadas hacia el envés, haz vellosa, -
envés algodonoso, verde blanquecino, zonas bronceadas.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz glabro, envés vellosa, verde
zonas bronceadas.

SARMIENTO HERBACEO.- Sin lenticelas, sección transversal circular, con-
torno con costillas, arañoso enteramente, verde con zonas pardo-rojizo
por un lado, parcialmente.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 00110110110110110.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Cuneorbicular, mediana, seno peciolar en parentesis, pen-
talobulada, seno lateral superior en lira, seno lateral inferior en V,
haz glabro, envés arañoso, haz y envés de 5 nervios, limbo plano, lóbu-
los planos, ángulo del vértice del lóbulo terminal obtuso, superficie -
estampada, nervios de primer orden sobre el envés verde amarillento, pur-
to peciolar rojo, nervios de primer orden sobre el haz verde claro, diez
tes de lados convexos, de color verde oscuro, sin brillo, limbo medio,
nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Medio, medio, algo arañoso, sección poco evi-
dente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Rastrera.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Pequeña, suelto, pedúnculo visible,
agostado hasta la 1ª ramificación, longitud relativa 1/2. Ver fotografía

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, tamaño regular, color negro azaba-
che, con mucha pruina, coloración regular, forma esférica, ombligo per-
sistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa
blanda, sabor neutro, pedicelo largo, de color verde, rodete evidente,
de color rojizo, pincel corto, de color rojizo, separación difícil. Ver
fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Con tendencia rojo vino oscuro.

SARMIENTO.- 286 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza se desprende,
sección transversal elíptica, superficie estriada, parcialmente con pruina,
nudos poco salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud me-
dia 11,3 cm. de color pardo rojizo, casi uniforme, yemas cónicas.

TRONCO.- Potente.

11-6

100 • 70

