





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS	CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 06
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA
	E X C U R S A C H
1.- SUMIDAD	A. media, glabro, borde ligeramente carminado. B. - media, arañosa, verde amarillanto, puntos rojizos.
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Algo plegadas al haz, haz y envés arañoso, verde, - zonas rojizas.
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Extendidas, haz glabro, envés nervios arañoso, verde.
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sección transversal circular, contorno con estrias, glabro, enteramente, verde rayas oscuras, enteramente.
5.- ZARCILLO	Intermitente. Fórmula: 1101101101101101101101101101101101101101101101101.
6.- FLOR	Ver fotografía.
7.- HOJA ADULTA	Media, seno peciolar en <del>lira</del> <sup>6</sup> <del>lira</del> , pentalobulada, seno lateral superior en <del>lira</del> <sup>6</sup> <del>lira</del> ó bordes superpuestos, seno lateral inferior en lira ó V, haz glabro, envés glabro, haz y envés de 5 nervios, limbo algo plegado al haz, lóbulos planos, ángulo del vértice del lóbulo terminal <del>obtus</del> obtuso, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, nervios de primer orden sobre el haz verde claro, dientes de lados convexos, de color verde oscuro, algo de brillo, limbo medio, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.
8.- PEGIOLLO DE LA HOJA ADULTA	Corto, medio, glabro, sección poco evidente.
9.- PORTE DE LA VEGETACION	Postrada.
10.- RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL	Medio, suelto, pedúnculo visible, agostado hasta la primera ramificación, longitud relativa 1/3. Ver fotografía.
11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL	Media, tamaño regular, color negro, con mucha pruina, coloración regular, forma discoide, ombligo persistente, sección transversal circular, zumo incoloro, piel media, pulpa crujiente, sabor neutro, pedicelo largo, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel medio, de color rojizo, separación difícil. Ver fotografía.
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.
13.- FOLLAJE EN OTOÑO	Rojizo.
14.- SARMIENTO	165 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza adherente, sección transversal circular, superficie con costillas, parcialmente con pruina, nudos aplastados, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 4,65 cm. de color amarillento, uniforme, yemas cónicas.
15.- TRONCO	Fuerte.



Instituto Nacional  
de  
Investigaciones  
Agronómicas

Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

EXCURSACH

