



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

M A N S E S D E T I B B U S

SUMIDAD.- A. media, algodonosa, bårdes carminados. B. media, algodonosa, blanco algo verde, dientes rojizos.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Algo plegadas al haz, haz y envés algodonoso, dientes glabros, casi blanco, dientes verde rojizos.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz arañoso, envés algodonoso, verde bronceado.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal elíptica, contorno con estrias, bastante arañoso, pincel veloso, verde rayas bronceadas, enteramente.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 0011011011011011011..

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Pentagonal, media, seno peciolar en U muy abierta, pentalo bulada, seno lateral superior en lira, seno lateral inferior en lira, haz glabro, envés algo veloso, haz y envés de 5 nervios, limbo plano, lóbulos algo torcidos, ángulo del vértice del lóbulo terminal obtuso, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde claro zona punto peciolar roja, nervios de primer orden sobre el haz rojo, dientes de lados convexos, de color verde, poco brillo, limbo grueso, nervios de orden 5º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Largo, medio, poco arañoso, algunos acerda dos, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrada.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Medio, semi, pedúnculo visible, herbáceo, longitud relativa 1/5. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, tamaño regular, color negro-azabache con pruina, coloración regular, forma discoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo largo, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel corto, de color verde-rojizo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde.

SARMIENTO.- 185 cm. de largo, fuerte-medio, ramificado, corteza adherente, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente sin pruina, nudos aplastados, parcialmente con pelo, blanco, entrenudos de longitud media 7,0 cm. de color amarillo-rojizo, a tiras, yemas cónicas,

TRONCO.- Fuerte.

12 73

