



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

P A R E L L A D A
=====

SUMIDAD.- A. globosa, algodonosa, blanquecina con bordes carminados. B. abierta, afelpada, verde muy claro con bordes rojos.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz arafioso, envés afelpado, verde rojizo.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Torcidas, haz y envés arafiosos, verde rojizo.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal cuadrangular, contorno con costillas, arafioso solo en la zona terminal, enteramente verde con zonas rojas.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 01011011001101101.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Orbicular, grande, seno peciolar en parentesis, algunas supuestas, pentalobulada, seno lateral superior en U, seno lateral inferior en V, haz glabro, envés arafioso, con 5 nervios, limbo plano, lóbulos casi planos, angulo del vertice del lóbulo terminal obtuso, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde amarillento punto peciolar rosado, nervios de primer orden sobre el haz verde oscuro, punto peciolar rosado, dientes de lados convexos de color verde oscuro, casi botella con poco brillo, limbo grueso, nervios de 5º orden. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Algo corto, medio, ligeramente arafioso.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrada.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Grande, compacto, pedunculo visible, semiagostado, longitud relativa 1/5. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, tamaño irregular, color amarillo, - con pruina, coloración irregular, forma esférica, ombligo persistente, - sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo corto de color verde, rodete evidente de color verde pincel corto de color verde amarillento, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 1. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde amarillento.

SARMIENTO.- 138 cm. de largo, fuerte, bastante ramificado, corteza adherente, sección transversal irregular, a veces circular, superficie es triada, nudos ligeramente salientes, totalmente glabros, entrenudos de longitud media 9,0 cm. de color rosaceo, con manchas oscuras, yemas cónicas.

TRONCO.- Medio.

Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas	Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA
	P A R E L L A D A
1.- SUMIDAD	A. globosa, algodonosa, blanquecina con bordes carminados. B. abierta, afelpada, verde muy claro con bordes rojos.
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Extendidas, haz arafioso, envés afelpado verde rojizo.
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Torcidas, haz y envés arafiosos, verde rojizo.
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sección transversal cuadrangular, contorno con costillas, arafioso solo en la zona terminal, enteramente verde con zonas rojas.
5.- ZARCILLO	Intermitente. Formula: 01011011001101101
6.- FLOR	Ver fotografía.
7.- HOJA ADULTA	Orbicular, grande, seno peciolar en parentesis, algunas superpuestas, pentalobuladas, seno lateral superior en U, seno lateral, inferior en V, haz glabro, envés arafioso con 5 nervios, limbo plano, lóbulos casi planos, angulo del vertice del lóbulo terminal obtuso, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde amarillento punto peciolar rosado, nervios de primer orden sobre el haz verde oscuro, punto peciolar rosado, dientes de lados convexos de color verde oscuro, casi bote lla con poco brillo, limbo grueso, nervios de 5º orden. Ver fotografía.
8.- PECIOLO DE LA HOJA ADULTA	Algo corto, medio, ligeramente arafioso.
9.- PORTE DE LA VEGETACION	Postrada
10.- RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL	Grande, compacto, pedunculo visible, semiagostado, longitud relativa 1/5. Ver fotografía.
11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL	Media, tamaño irregular, color amarillo, con pruina, coloración irregular, forma esférica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa, jugosa, sabor neutro, pedicelo corto de color verde amarillento, separación difícil. Ver fotografía.
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 1. Ver fotografía.
13.- FOLLAJE EN OTOÑO	Verde amarillento.
14.- SARMIENTO	138 cm. de largo, fuerte, bastante ramificado, corteza adherente, sección transversal irregular, a veces circular, superficie estriada, nudos ligeramente salientes, totalmente glabros, entrenudos de longitud media 9,0 cm. de color rosaceo, con manchas oscuras, yemas cónicas.
15.- TRONCO	Medio.

(NO SALIENTE)

74-40

Instituto Nacional
de
Investigaciones
Agronómicas

Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

PARELLADA



FEB • 72

