



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

S A B A T E
=====

SUMIDAD.- A. media, vellosa, borde ligeramente carminado. B. media, vellosa, verde blanquecino, manchas carmín.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Plegadas al haz, haz y envés vellosos ó algo donodo, dientes glabros, verde blanquecino, dientes verdes.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz arañoso, envés vellosos, dientes glabros, verde blanquecino, bordes bronceados.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular, contorno con estrias, arañoso final vellosos, verde con zonas bronceadas.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula 00110110110110110011011.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Pentagonal lado de base en arco, grande, seno peciolar en parentesis ó en U, pentalobulada, ó trilobulada, seno lateral superior en lira, o V, seno lateral inferior en V (cuando existe), haz glabro menos arañoso, envés muy arañoso, haz y envés de 5 nervios, limbo plano, lóbulos algunos torcidos, ángulo del vértice del lóbulo terminal recto, superficie algo estampada, nervios de primer orden sobre el envés verde amarillento, punto peciolar rojo, nervios de primer orden sobre el haz verde claro con manchas rojas, dientes de lados convexos de color verde oscuro, poco brillo, limbo grueso, nervios de orden 5º no salientes. -- Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, grueso, arañoso, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrada.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Grande, semi-compacto, pedúnculo visible, herbáceo, longitud relativa 1/5. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Grande, tamaño irregular, color azul-oscuro, con pruina, coloración irregular, forma esferoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa -- crujiente, sabor neutro, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente de color verde, pincel pequeño, de color amarillo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde.

SARMIENTO.- 112 cm. de largo, media, poco ramificado, corteza adherente sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos aplastados totalmente glabros, entrenudos de longitud media 5,6 cm. de color amarillo grisáceo, uniforme, yemas cónicas.

TRONCO.- Potente.

12-78

