



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

P A R D U C A

=====

SUMIDAD.- A. globosa, muy arañosa, verde blanquecino, bordes bronceados.
B. globosa, muy arañosa, verde blanco partes iguales.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz y envés vellosos, blanco verdoso.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Algo plegadas al haz, haz arañoso y envés vellosos, verde blanquecino.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal cilíndrica, casi liso, contorno totalmente bronceado, algo arañoso, enteramente.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 01011011011011011011.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Orbicular, pequeña, seno peciolar en U a veces abierta, pentalobulada, seno lateral superior en lira cerrada ó bordes superpuestos, seno lateral inferior en U y lira, haz algo arañoso, envés muy arañoso, haz y envés de 5 nervios, envés acerdado, haz algo arañoso, limbo en general plano, lóbulos planos, ángulo del vértice del lóbulo terminal obtuso, superficie algo estampada, nervios de primer orden sobre el envés rojo en punto peciolar, resto verde, igual que en envés, nervios de primer orden sobre el haz rojo en punto peciolar, resto verde, dientes de lados convexos, de color verde fuerte, sin brillo, limbo medio, nervios de 4º orden no salientes. Ver fotografía.

PECIOLLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, delgado, algo arañoso, sección no aparente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Casi rastrera.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Medio, compacto, pedúnculo poco visible, semiagostado hasta la 1ª ramificación, longitud relativa 1/6. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, tamaño regular, color azul rojizo, poca pruina, coloración regular, forma tronco esferocónica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa blanda, sabor neutro, pedicelo corto, de color verde, rodete evidente, de color rosado, pincel medio, de color rosado, separación fácil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 3. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Amarillo algo verdoso con muchas zonas rojo escarlata.

SARMIENTO.- 199 cm. de largo, fuerte, algo ramificado, corteza adherente, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 7,6 cm. de color marrón amarillento, casi uniforme, yemas cónicas.

TRONCO.- Medio.

