



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

V A L E N C I A N A B A R B E R A
=====

SUMIDAD.- A. globosa, algodonosa, blanca con algún borde carminado, B. - media, casi algodonosa, blanca con manchas carminadas.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz velloso, envés algodonoso, - blancas verdosas con manchas carminadas.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Algo dobladas hacia el envés, haz arañoso, en vés algodonoso, verdes amarillentas.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal algo elíptica, contorno con costillas, parcialmente algo arañoso, parcialmente verde con rayas pardas.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 0011001101101101101101101100

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Orbicular, grande, seno peticolar estrecho con bordes paralelos, pentalobulada, seno lateral superior en V o lira, seno lateral inferior en V, haz glabro, envés velloso, con 5 nervios, limbo plano, algo torcido, lobulos algo arrollados hacia el haz, angulo del vertice del lobuloterminal obtuso, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés y haz verdes, dientes de lados convexos y rectilíneos de color verde botella, con algo de brillo, limbo grueso, nervios de 5º orden no salientes. Ver fotografía.

PECIOLLO DE LA HOJA ADULTA.- Medio, grueso, glabro, sección no evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrada.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Grande, medio, pedunculo visible, semiagostado, longitud relativa 1/5. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, tamaño irregular, color amarillo, - con pruina, coloración irregular, forma esférica, ombligo persistente, - sección transversal regular, zumo incoloro, piel fina, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo medio de color verde, rodete evidente de color verde, pincel medio de color amarillo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde algo amarillento.

SARMIENTO.- 197 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza adherente, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos poco salientes, enteramente glabros, entrenudos de longitud media 11,3 cm. de color marrón uniforme, yemas cónicas.

TRONCO.- Potente.

Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas	Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA
	V A L E N C I A N A B A R B E R A
1.- SUMIDAD	A. globosa, algodonosa, blanca con algún borde - carminado, B. media, casi algodonosa, blanca con manchas carminadas.
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Extendidas, haz veloso, envés algodonoso, blancas verdosas con manchas carminadas.
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Algo dobladas hacia el envés, haz arafioso, envés algodonoso, verdes amarillentas.
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sección transversal algo elíptica, contorno con costillas, parcialmente algo arafioso, parcialmente verde con rayas pardas.
5.- ZARCILLO	Intermitente. Formula: 0011001101101101101101101100.
6.- FLOR	Ver fotografía.
7.- HOJA ADULTA	Orbicular, grande, seno peciolar estrecho con bordes, paralelos ^{superiores} , pentalobulada seno lateral superior en V o lira, seno lateral inferior en V, haz glabro, envés veloso, con 5 nervios, limbo plano, algo torcido, lobulos algo arrollados hacia el haz, ángulo del vertice del lobulo terminal obtuso, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés y haz verdes, dientes de lados convexos y rectilíneos de color verde botella, con algo de brillo, limbo grueso, nervios de 5º orden no saliente. Ver fotografía.
8.- PECIOLO DE LA HOJA ADULTA	Medio, grueso, glabro, sección no evidente.
9.- PORTE DE LA VEGETACION	Postrada.
10.- RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL	Grande, medio, pedunculo visible, semiagostado, longitud relativa 1/5. Ver fotografía.
11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL	Media, tamaño irregular, color amarillo, con pruina, coloración irregular, forma esférica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel fina, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo medio de color verde, rodete evidente de color verde, pincel medio de color amarillo, separación difícil. Ver fotografía.
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.
13.- FOLLAJE EN OTÓN	Verde algo amarillento.
14.- SARMIENTO	197 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza adherente, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos poco salientes, enteramente glabros, entrenudos de longitud media 11,3 cm. de color marrón uniforme, yemas cónicas.
15.- TRONCO	Potente.

VALENCIANA BARBERA

B V



15 D 2

