



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

V I Ñ A T E
=====

SUMIDAD.- A. media, afelpada, blanca con borde carminado. B. media, afelpada, verde blanquecina.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Algo dobladas hacia el envés, haz velloso, envés afelpado con bordes glabros, verde amarillento.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz arafioso, envés afelpado, verde claro.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal elíptica, contorno con costillas, totalmente arafioso, más en la zona terminal, verde con alguna raya rojo - en la base.

ZARCILLO.- Intermitente, Formula: 000110011011011

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Orbico-cuneiforme, grande, seno peciolar en lira, pentalobulada, seno lateral superior en lira cerrada, seno lateral inferior en lira y V, haz glabro, envés casi velloso, con 5 nervios, limbo torcido, lobulos plegados, angulo del vertice del lobulo terminal recto, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde amarillento, nervios de primer orden sobre el haz verdes, dientes de lados de todas las formas, la mayoría convexos, de color verde botella con poco brillo, limbo medio, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Medio, grueso, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Casi rastrero.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Grande, suelto, pedunculo visible, - agostado hasta la primera ramificación, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, tamaño irregular, color amarillo, con pruina, coloración irregular, forma esférica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel medio, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo largo, a veces medio de color amarillo verdoso, rodete evidente de color verde, pincel medio de color amarillo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde amarillento.

SARMIENTO.- 166 cm. de largo, fuerte, muy ramificado, corteza adherente, sección transversal aplastada, superficie con estrias, sin pruina, nudos salientes, totalmente glabros, entrenudos de longitud relativa 7,3 cm. de color marrón rojizo con puntos oscuros, yemas en dardo.

TRONCO.- Debil.



181

