

VACUNACIÓN POR GRUPOS DE RIESGO EN ≥ 18 AÑOS

2024



| | Inmunodeprimidos (excluidos VIH) | VIH | | Enfermedad cardiovascular y respiratoria crónica. Diabetes | Enfermedad hepática crónica. Alcoholismo crónico | Insuficiencia renal crónica. Hemodiálisis | Asplenia, déficit complemento tratamiento con eculizumab | Embarazo | Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres | Hombres y mujeres en situación de prostitución | Mujeres con tratamiento lesión intraepitelial de alto riesgo de cervix | Contactos familiares y cuidadores de inmunodeprimidos | Profesionales sanitarios | Trasplantados progenitores hemotopoyéticos | Trasplante órgano sólido |
|--------------------------------|--|------------------------|---|--|--|---|--|----------|--|--|--|---|--------------------------|--|--------------------------|
| | | CD4<15% O <200µl | CD4≥15% O >200µl | | | | | | | | | | | | |
| Hepatitis B | 3 dosis | 3 dosis | | | 3 dosis | 3 dosis | | | 3 dosis | 3 dosis | | | 3 dosis | 3 dosis | 3 dosis |
| Tétanos-difteria | Vacunar o completar vacunación hasta 5 dosis | | | | | | | | | | | | | | |
| Difteria-Tétanos- Pertussis | | | | | | | | 1 dosis | | | | | 1 dosis ^(a) | 4 dosis ^(b) | 1 dosis ^(c) |
| Haemophilus influenzae b | | | | | | | 1 dosis | | | | | | | 4 dosis | |
| Neumococo conjugada | 1 dosis | 1 dosis | 1 dosis | 1 dosis | 1 dosis | 1 dosis | 1 dosis | | | | | | | 4 dosis | 1 dosis |
| Meningococo B | | | | | | | 2 dosis | | | | | | | 2 dosis | |
| Menigococo A, C, W, Y | | 2 dosis | | | | | 2 dosis | | | | | | | 2 dosis | |
| Sarampión- Rubeola-Parotiditis | X | X | Vacunar con dos dosis si susceptible ^(d) | | | | | X | | | | | | X | X |
| Varicela | X | X | Vacunar con dos dosis si susceptible ^(d) | | | | | X | | | | | | X | X |
| Virus del Papiloma Humano | | 3 dosis | | | | | | | 2 dosis | 2 dosis | 3 dosis | | | 3 dosis | 3 dosis |
| Herpes Zóster | 2 dosis | 2 dosis | | | | | | | | | | | | 2 dosis | 2 dosis |
| Hepatitis A | | 3 dosis ^(e) | 2 dosis | | 2 dosis | | | | 2 dosis | 2 dosis | | | 2 dosis ^(f) | | |
| Gripe | 1 dosis | 1 dosis | 1 dosis | 1 dosis | 1 dosis | 1 dosis | 1 dosis | 1 dosis | | | | 1 dosis | 1 dosis | 1 dosis | 1 dosis |

- (a) Áreas pediátricas de riesgo.
- (b) Se recomienda vacunación con DTPa de alta carga. En estos pacientes se acepta el uso de vacuna pediátrica hexavalente en todas las edades.
- (c) Si no vacunado en los últimos 10 años.
- (d) Si susceptible (no haber pasado la enfermedad o no vacunado con 2 dosis).
- (e) 3 dosis si CD4 < 350mm³.
- (f) 2 dosis en trabajadores sanitarios que trabajan en entornos de riesgo o tienen factores de riesgo: mayores de 50 años susceptibles, hepatópatas crónicos o candidatos a trasplante hepático, inmunodeprimidos, personal de laboratorio en contacto con el VHA.

* Las recomendaciones de vacunación frente a COVID-19 se valorarán al final de la temporada 2023-2024.

X Vacuna contraindicada. **Con rayas** Administración en personas susceptibles o no vacunadas con anterioridad.

