

Boletus aereus Bull.



Boleto bronceado, boleto u hongo negro
© José Cuesta y Javier Marcos

Neoboletus erythropus (Pers.) C. Hahn (≡ Boletus erythropus Pers.)



Pie rojo
© José Cuesta y Miguel Ángel Ribes

Boletus pinophilus Pilát & Dermek (≡ B. pinicola Vittad.)



Boleto rojizo, boleto u hongo del pino
© Javier Marcos

	<i>Boletus aereus</i>	<i>Boletus pinophilus</i>	<i>Neoboletus erythropus</i>
Sombrero	Marrón oscuro con tonos cobrizos, a veces con zonas más claras. De joven con fina pruina blanquecina	Marrón rojizo, algo vinoso. De joven con fina pruina blanquecina	Marrón a castaño rojizo, aterciopelado
Poros	Blancos, al final amarillo oliváceos	Blancos, al final amarillo oliváceos	Rojos, anaranjados, se vuelven azules al roce
Pie	Robusto, claviforme a ventrudo, con retículo que normalmente no llega a la base	Grueso, ventrudo, con retículo más marcado en lo alto del pie, blanquecino a marrón	Robusto, no reticulado, punteado con granulaciones rojas que azulean al roce
Carne	Blanca inmutable, de olor y sabor agradable	Blanca inmutable, de olor y sabor agradable	Amarilla, azul oscura inmediatamente al cortarla
Observaciones	<i>Boletus aereus</i> tiene el sombrero marrón y crece en planifolios, mientras que <i>B. pinophilus</i> tiene tonos rojizos y fundamentalmente es de pinares, pero puede aparecer en algunos planifolios, como hayas o castaños, incluso es frecuente en algunos melojares puros. <i>Neoboletus erythropus</i> es una especie comestible bien cocinada, y al hacerlo la carne pierde el tono azul, pero podría confundirse con otros <i>Boletus</i> de poros rojos tóxicos, por lo que no se puede comercializar.		