

*Boletus edulis* Bull.



Hongo, calabaza, boleto comestible, miguelo  
© Juan Carlos Campos

*Tylophilus felleus* (Bull.) P. Karst.



© Miguel Ángel Ribes Boleto amargo, camaleón rojo, chupasangre

*Boletus reticulatus* Schaeff. (= *B. aestivalis* (Paulet) Fr.)



Boleto reticulado o de verano, tentullo  
© Javier Marcos y José Cuesta

	<i>Boletus edulis</i>	<i>Boletus reticulatus</i>	<i>Tylophilus felleus</i>
<b>Sombrero</b>	Marrón oscuro, con margen blanquecino	Marrón más claro, sin margen blanquecino	Marrón claro a marrón cuero, a veces con tonos oliváceos
<b>Poros</b>	Blancos, al final amarillo oliváceos	Blancos, al final amarillo oliváceos	Blancos a rosados, al final rosa lilacino
<b>Pie</b>	Cilíndrico a ventrudo, ocre, con fino retículo blanquecino, más marcado en la parte alta del pie	Cilíndrico a ventrudo, ocre, con retículo claro u oscuro muy evidente	Con retículo muy marcado, casi acostillado, marrón oscuro sobre fondo más claro
<b>Carne</b>	Blanca inmutable, de sabor agradable a frutos secos	Blanca inmutable, de sabor agradable a frutos secos	Blanca virando levemente al rosa, muy amarga
<b>Observaciones</b>	<i>Boletus edulis</i> es otoñal y tiene el margen del sombrero típicamente blanquecino, mientras que <i>B. reticulatus</i> es mayoritariamente primaveral/estival y no lo tiene de adulto, además el segundo tiene el retículo más marcado. Los cuatro <i>Boletus</i> de la antigua sección <i>Edules</i> ( <i>B. edulis</i> , <i>aereus</i> , <i>pinophilus</i> y <i>reticulatus</i> ) tienen el margen blanquecino de jóvenes, pero sólo suele permanecer en <i>B. edulis</i> desarrollados. <i>Tylophilus felleus</i> es una especie muy amarga, pero no es tóxica, por lo que no es comestible ni comercializable.		