

Calocybe gambosa (Fr.) Donk



Seta de San Jorge, perrechico, mansarón
© Miguel Ángel Ribes y Javier Marcos

Entoloma sinuatum (Bull.) P. Kumm. (= E. lividum Qué.)



Seta engañosa, pérfrida
© Miguel Ángel Ribes

Pseudoclitopilus rhodoleucus (Sacc.) Vizzini & Contu
(≡ *Lepista rhodoleuca* (Sacc.) Maire)



© Javier Marcos

	<i>Calocybe gambosa</i>	<i>Entoloma sinuatum</i>	<i>Pseudoclitopilus rhodoleucus</i>
Sombrero	Convexo, carnoso, sin máculas	Convexo, plano o cóncavo, carnoso, sin máculas	Convexo, plano o cóncavo, carnoso, en ocasiones con máculas
Láminas	Sinuosas, escotadas, blancas	Adnatas, sinuosas o ventrudas, primero amarillentas, luego asalmonadas	Decurrentes, inicialmente rosáceas, se vuelven blanquecinas con la edad
Olor y sabor	Harinoso	Harinoso	Saponáceo
Esporada	Blanca en masa	Rosa en masa	Blanca en masa
Observaciones	<i>Calocybe gambosa</i> crece en prados y zonas herbosas de diversos bosques en primavera formando corros de brujas, pudiendo compartir hábitat y época de aparición con <i>Pseudoclitopilus rhodoleucus</i> , especie tóxica. Excepcionalmente se ha observado <i>Calocybe gambosa</i> compartiendo ecología y época de fructificación con <i>Entoloma sinuatum</i> , también tóxica, en zonas herbosas de robledales en primaveras lluviosas y cálidas, aunque generalmente fructifica durante el otoño.		