

Cantharellus cibarius Fr.



© Ibai Olariaga Rebozuelo, cabrilla, seta de San Juan

Omphalotus illudens (Schwein.) Bresinsky & Besl.



© Pablo Pérez-Daniéls

Cantharellus pallens Pilát (= *C. subpruinus* Eyssart. & Buyck)



© Ibai Olariaga Rebozuelo, cabrilla, seta de San Juan

	<i>Cantharellus cibarius</i>	<i>Cantharellus pallens</i>	<i>Omphalotus illudens</i>
Sombrero	Amarillo anaranjado sin manchas rojizas	Blanco a amarillo anaranjado con manchas rojizas	Naranja vivo
Láminas	No tiene láminas verdaderas, son pliegues	No tiene láminas verdaderas, son pliegues	Láminas bien formadas
Crecimiento	Solitario o en pequeños fascículos	Solitario o en pequeños fascículos	Cespitoso, en grandes fascículos
Hábitat	Suelo en bosque	Suelo en bosque	Madera, en la base de árboles
Observaciones	<i>Cantharellus cibarius</i> y <i>C. pallens</i> (= <i>C. subpruinus</i>) prácticamente sólo se diferencian en el color del sombrero, amarillo sin manchas rojizas en <i>C. cibarius</i> y blanco amarillento con manchas rojizas en <i>C. pallens</i> , y se han comercializado tradicionalmente ambos como <i>C. cibarius</i> (rebozuelos), por lo que hay que considerarlos a ambos como comercializables. La confusión con <i>Omphalotus illudens</i> puede causar una intoxicación más o menos intensa. Se diferencian por el color del sombrero naranja intenso y la presencia de láminas verdaderas en <i>Omphalotus illudens</i> .		

Cantharellus cibarius Fr.



© Ibai Olariaga Rebozuelo, cabrilla, seta de San Juan

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire



© Miguel Ángel Ribes Falso rebozuelo, rebozuelo anaranjado

Cantharellus pallens Pilát (= *C. subpruinus* Eyssart. & Buyck)



© Ibai Olariaga Rebozuelo, cabrilla, seta de San Juan

	<i>Cantharellus cibarius</i>	<i>Cantharellus pallens</i>	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>
Sombrero	Amarillo anaranjado, sin manchas rojizas	Blanco a amarillo anaranjado, con manchas rojizas	Naranja vivo
Láminas	No tiene láminas verdaderas, son pliegues	No tiene láminas verdaderas, son pliegues	Láminas bien formadas, bifurcadas, separables fácilmente
Crecimiento	Solitario o en pequeños fascículos	Solitario o en pequeños fascículos	Solitario
Hábitat	Suelo en bosque	Suelo en bosque	Madera, hojarasca en bosque
Observaciones	<i>Cantharellus cibarius</i> y <i>C. pallens</i> (= <i>C. subpruinus</i>) prácticamente sólo se diferencian en el color del sombrero, amarillo sin manchas rojizas en <i>C. cibarius</i> y blanco amarillento con manchas rojizas en <i>C. pallens</i> , y se han comercializado tradicionalmente ambos como <i>C. cibarius</i> (rebozuelos), por lo que hay que considerarlos a ambos como comercializables. La confusión con <i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> , especie comestible no comercializable, no causaría problemas de intoxicación. Se diferencian en la presencia de láminas auténticas fácilmente separables del sombrero en <i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> .		

© Miguel Ángel Ribes