

Craterellus lutescens Fr. (≡ *Cantharellus lutescens* Fr.)



Angula de monte, rebozuelo anaranjado, trompeta amarilla

© José Cuesta

Craterellus tubaeformis (Fr.) Quél. (≡ *Cantharellus tubaeformis* Fr.)



Rebozuelo atrompetado, trompeta amarilla, angula de monte

© Ibai Olariaga y Jorge Hernanz

Lichenomphalia umbellifera (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (= *Clitocybe ericetorum* (Pers.) Fr.)



© Ibai Olariaga

	<i>Craterellus lutescens</i>	<i>Craterellus tubaeformis</i>	<i>Lichenomphalia umbellifera</i>
Sombrero	Afelpado	Afelpado o con fibrillas	Liso, estriado por transparencia
Himenóforo	Liso a arrugado. Habitualmente amarillo	Con pliegues. Inicialmente amarillo, después gris	Con láminas profundas blancas
Pie	Hueco	Hueco	Lleno
Observaciones	<i>Craterellus lutescens</i> y <i>Craterellus tubaeformis</i> son dos especies muy similares que se diferencian por el himenóforo, casi liso en la primera y con pliegues en la segunda. Podrían confundirse remotamente con <i>Lichenomphalia umbellifera</i> (= <i>Clitocybe ericetorum</i>), incluida en la parte D del Anexo (especies no comercializables), aunque no hemos encontrado ninguna referencia acerca de su toxicidad. En ocasiones se han recolectado ejemplares de <i>Leotia lubrica</i> , especie pequeña, viscosa, sin láminas, creciendo entre los pies de <i>C. lutescens</i> , que produce un síndrome giromitrano.		



Leotia lubrica (Scop.) Pers.



© Miguel Ángel Ribes