

Hygrophorus agathosmus (Fr.) s.l.



© Gabriel Moreno Llanega gris, seta olor de almendra

Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm.



© Gabriel Moreno Pardilla

Hygrophorus agathosmus (Fr.) s.l.



© Miguel Ángel Ribes Llanega gris, seta olor de almendra

	<i>Hygrophorus agathosmus</i>	<i>Clitocybe nebularis</i>
Sombrero	Mediano, de 4-8 cm de diámetro, viscoso	Grande, de 10-15(20) cm de diámetro, no viscoso
Láminas	Espaciadas y blanquecinas, sin tonos ocráceos en la madurez	Apretadas y con tonos ocráceos en la madurez
Olor	A almendras amargas y anís	Fúngico, fuerte y característico
Hábitat	Bosques de coníferas	En zonas nitrificadas, tanto en bosques de coníferas como de planifolios
Observaciones	<i>Hygrophorus agathosmus</i> se caracteriza bien por su sombrero viscoso grisáceo, láminas decurrentes blanquecinas y por su típico olor a almendras amargas con matices anisados. Se puede confundir con <i>Clitocybe nebularis</i> , que es una especie consumida tradicionalmente, de mayor tamaño, con las láminas apretadas, con tonos ocráceos en la madurez, pero que a algunas personas le ocasiona trastornos gastrointestinales muy largos pero poco violentos, lo que hace que en la actualidad se catalogue como una especie tóxica y no comercializable. Estudios recientes (Bellanger & al., 2021) señalan que el auténtico <i>H. agathosmus</i> fructifica bajo píceas en el norte de Europa, mientras que en el sur de Europa, bajo pinos, se da <i>H. pinophilus</i> E. Larss., Sesli & Loizides.	