

***Hygrophorus limacinus* (Scop.) Fr. (= *H. latitabundus* Britzelm.)**



Babosa, llanega, llanega negra, mocosa  
© José Cuesta

***Hygrophorus glutinifer* Fr.**

(= *H. persoonii* Arnolds; = *H. dichrous* Kühner & Romagnesi)



Llanega  
© José Cuesta

***Hygrophorus limacinus* (Scop.) Fr. (= *H. latitabundus* Britzelm.)**



Babosa, llanega, llanega negra, mocosa  
© Miguel Ángel Ribes

	<b><i>Hygrophorus limacinus</i></b>	<b><i>Hygrophorus glutinifer</i></b>
<b>Sombrero</b>	Grande, de 4-15 cm de diámetro, grisáceo cremoso	Pequeño, de 3-6 cm de diámetro, con tonos ocráceos
<b>Láminas</b>	Blanquecinas, sin tonos ocráceos en la madurez	Blanquecinas, con tonos cráceos en la madurez
<b>Pie</b>	Viscoso, glutinoso, con tonos grisáceos	Viscoso, glutinoso, con tonos ocráceos
<b>Hábitat</b>	En bosques de coníferas	En bosques de <i>Quercus</i> (melojares, encinares y alcornocales), principalmente
<b>Observaciones</b>	<p><i>Hygrophorus limacinus</i> se caracteriza por su porte robusto, sombrero viscoso, láminas blanquecinas, gruesas y espaciadas y pie fusiforme muy viscoso casi hasta el ápice. Es una seta frecuente en pinares basófilos de áreas mediterráneas. Fructifica con el frío y aguanta las primeras heladas. Es muy apreciada en algunas zonas por su carne firme, blanca y de olor suave.</p> <p><i>Hygrophorus glutinifer</i> es una especie próxima, también comestible de menor calidad, pero no comercializable, que se puede diferenciar por su menor tamaño, las coloraciones ocráceas del sombrero y pie y fructificar en bosques de <i>Quercus</i> principalmente.</p>	