

Lactarius sanguifluus (Paulet) Fr.



© Juan Carlos Campos y José Gerardo López **Níscalo vinoso**

Lactarius chrysorrheus Fr.



© Jorge Hernanz **Falso níscalo**

Lactarius sanguifluus f. *vinosus* (Quél.) Lalli & Pacioni



© Javier Marcos **Níscalo borracho**

	<i>Lactarius sanguifluus</i>	<i>Lactarius sanguifluus</i> f. <i>vinosus</i>	<i>Lactarius chrysorrheus</i>
Láminas	Carneo cremoso a lilacinas	Carneo lilacinas	Crema blanquecinas
Látex	Escaso (pero mancha al tacto) de color rojo	Escaso (pero mancha al tacto) de color rojo	Abundante, primero blanquecino y luego amarillento
Carne	No picante. Roja al corte	No picante. Roja vinoso al corte	Picante. Blanquecina a amarillenta al corte
Hábitat	Pinares	Pinares	Bajo planifolios: encinas, robles, hayas y castaños
Observaciones	<p><i>Lactarius sanguifluus</i> y su forma <i>vinosus</i> es una especie micorrícica que sólo se asocia a pinos, pero es muy frecuente encontrar planifolios entre los pinos, en los que pueden fructificar otras especies. En la Comunidad de Madrid es mucho más abundante lo que se ha llamado forma <i>vinosus</i> que la especie tipo, aunque algunos autores ponen en duda la existencia de esta forma <i>vinosus</i> y otros creen que se trata de dos especies distintas. <i>Lactarius chrysorrheus</i> es una especie de la que no hay constancia de que haya producido intoxicaciones, es más, se consume habitualmente en vinagreta o en guisos en algunas regiones de España. Sin embargo, dado que es extremadamente picante, puede producir algún problema intestinal en personas intolerantes al picante, y no se puede comercializar.</p>		